

太醫院經驗奇效良方大全

新刊大關院奇效良方大全卷之六十三

婦人門

附錄

素天素六氣地布五行五六相參造萬化一天地之面於是
黃帝岐伯相為問答必推運氣之勝伏以月成疾之根源自非
得傳于師得悟于心貫天紀於人經極道樞為日用孰能究其
所以然哉載稽古始自岐黃以來聖賢繼出使億兆之民皆得
有生之樂而無疾疢之苦所有婦人一科感疾異於男子者多
前人已註產寶方書大全良方載之胎前產後并雜病備矣今
略其初要并脉法開列于後

論形質受胎之始

太初者凡有之本也天得之以統氣太始者有形之本也地
得之以統形故稷清為天稟陽剛機而土乎上重濁為地積陰

柔順而震乎下感坤德而行化應乾道以經營是以天地相因
生生化化品物彰矣易曰大哉乾元萬物資始故陽施陰化血
氣和調感而為妊者亦資始資生之理也夫兆形之初命門先
具天一生水土主為陽水合丁之陰火而生丙為命門然後生心
心主血脈丙為陽火合辛之陰金而生庚有辛然後生肺肺主
皮毛庚為陽金合乙陰木而生甲有肺然後生肝肝主筋爪甲
為陽木合己之陰土而生戊有肝然後生脾脾三肌肉戊為陽
土合癸之陰水而生壬有脾然後生腎腎主骨骨髓臟合於五
行本其性情互相剋制及其配合互相生成且妊娠胚胎懷施
于此者乃在母腹中之事皆有經之可證也所以妊者食氣於
母所以養其形食味於母所以養其精滋育氣味為本故天之
五氣地之五味母既食之而胎又食之外則充乎形質內則滋
乎胎氣皆藉氣味之養育也今胎之所食始起厥陰也聖濟

云原四時所化始於木也究十二經之所養始於肝也故一
血氣足厥陰肝經養之膽乃肝之腑二月肝兆足少陽膽經養
之三月陽神為魂木生火手心主包絡經養之四月陰靈為魄
手少陽三焦經養之五月五行分五臟火生土足太陰脾經養
之六月六律定六腑足陽明胃經養之七月七清開七竅通光
明也土生金手太陰肺經養之八月八景神具濟真靈也手陽
明大腸經養之九月宮室羅布以定精也十月家足萬象成也
足太陽膀胱經養之自肝為胎臟腑相滋各養三十日此食於
母以養其精也且手太陽小腸經手少陰心經此二經不在十
月養經之數平居之日在下為月水有胎之時在上為乳汁故
不養於胎也夫胚胎之兆始也受水精而成血脉受火精而成
氣受金精而成筋受木精而成骨受土精而成膚革皮毛五行
具而百骸皆備此所以集萬物之靈

有奇耦之充耗剛柔

之強弱榮衛之盈虛一時所感乃於氣形稟賦之始此皆杳然之中稟於清者其子聰明智慧壽而且康稟於濁者愚癡不壽妻在節慾以全其真陰陽配合得子必壽素問云陰陽所奉其人壽也昔有人妻妾多而無子擇良家未笄之女相配亦無子曰求男有道乎褚澄曰合男女必當其年男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁此皆陰陽之氣完實然後交合則交而孕孕而育育而為子堅壯壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣早泄未稟而傷未動是以交而不孕孕而不育育而子脆不壽此配合太早有傷陰陽以無子也有婦人所產皆女者多慾之過也所產皆男者此男子慾慾惜精以婦人經行後一日三日五日於夜半時生氣瀉精受泄必男經行後四日六日瀉精者受泄皆女若過六日瀉精者受泄皆男文若過六日已後包絡新血已滿雖交終難成孕今

華節要書當鑑之

婦女月經何名天癸先期後期交生諸疾

夫天癸者天者天真之氣降與流之癸者北方壬癸之水故壬
為陽水配丁而化木癸為陰水合戊而化火經曰水火者陰陽
之徵兆也且婦人衆陰之所集以陰類陰故得水之癸干也文
至二七腎氣全盛衝任流通經血漸盈應時而經水真氣降與
之從事故云天癸也常以三旬而一見不失其時又名月信也
內經謂二七而天癸至然衝為血海任主胞胎脈靜海滿二者
相資故令有子若或愆期或先期者或閉而不行皆成病也且
閉而不行者內經陰陽別論云二陽之病發於心脾有不得隱
曲女子不月其傳為風消為息賁者死不治夫經者血脈津液
所化津液既絕為熱所燥肌肉消瘦特見渴躁血海枯竭病名
血枯治法經絕宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣或有經不

行疑認為胎者有矣或心包脉洪數躁作時見大便必澀小便
清而不利經水閉絕不行此乃血海乾枯宜調血脉除包絡中
火邪而經自行矣內經所謂小腸移熱於大腸為虛癢為沉月
澀不利則月事沉滯而不利故云虛癢為沉也或因勞心心火
上行月事不來者胞絡閉也胞脉者屬心而絡於胞中令氣上
通肺心故不得下月事不來也大抵陰為陽所搏溫劑不可太
過過則無益而反害以涼血和血則經自行又有經水不調或
黑或紫丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其經黑赤色也
血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則
凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁上應於月其行有常名之曰
經為氣之配因氣而行成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯
也來後作痛者氣血皆虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯
經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但已

紫者黑者作痛者成塊者指於風冷乘之而行溫熱之劑禍不
輕矣凡論月水病源皆曰風冷乘之以其相習而成俗也或曰
黑者北方水之色也紫者黑之漸也非冷而何經曰亢則害承
乃制熱甚者必煎水化所以熱則紫甚則黑也况婦人性執偏
鄙嗜慾加倍臟腑厥陽之熱日不起非熱而何且經漏不止
者內經云陰虛陽搏謂之崩東垣曰婦人脾胃致命門脈
沉細而發疾或沉弦而洪大有力寸關脈亦然皆由脾胃有虧
下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月
腐肉之臭中有白帶者脈必弦細有赤帶者其脈洪數必腰痛
脐下痛臨經欲行先見寒熱往來兩脇急縮無脾胃病出見或
四肢困熱心煩不得眠卧心下痞宜大脾胃升舉血氣世俗
以赤白之分白者為寒此其誤矣所謂下者任脈之病經曰
任脈者起於中極之下以上毛際循腹上關元至咽喉上頤

指而入見注舌任脉自胞上過帶脉貫臍而上然其病所發正
在過帶脉之分而淋瀝以下故曰帶下也赤白與下疳義同而
無寒者蓋赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本也戴人云赤
白疳者是邪熱傳於大腸下賁腸出赤白也帶下者傳為小腸
入肝經下赤白也若濕熱結於任脉故津液湧溢是為赤白帶
下其為證也頭目昏眩口苦舌乾咽嗌不利小便赤澀大便秘
滯脉實而數者皆熱證也經曰亢則害承乃制謂亢過極則反
無勝已之化制其甚也如以火鍊金熱極則反為水又如六
月熱極則物反出液而濕潤林木流津故心熱甚則出汗肝熱
甚則山泣脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾亦猶
煎湯熱甚則沸溢又熱氣熏蒸於物而生津者也故下部任脉
濕熱甚者津液湧溢而為帶下也內經曰少陰寃熱洩出白沫
寃者屈也結也客熱滯而不散屈之猶寄也遺客於帶脉之

間白物滿溢隨波而下綿綿不絕多不痛也或有痛者則墜溺
因塞而成痛者又云思想無窮所願不得意淫於外入房太甚
發為筋痿及為白淫謂白物淫積如精之狀男子溺漫而下女
子陰器中綿綿而下也俗醫將此為白帶治之而用辛熱之藥
病之微者畏中有之蓋辛熱之性暫能開通鬱結散氣流濕而
取効或病甚者鬱結不能開通舊病轉加熱證以致於死
夫抵以辛劑薰佐苦寒治之開結除濕去熱散氣無不中其病
而免其害東垣治一婦人帶下久不止者諸藥不効診其脉心
包尺脉極微白帶流而不止後用人參黃芩郁李仁乾薑白葵
花昆胡夾甘草陳皮名補經固真湯服此効矣又經水失常隨
氣為病海藏備述四物湯加減其有立意順四時升降浮沉之
理熟多寒少之證若春時四物湯加防風倍川芎夏時四物湯
加黃芩倍芍藥秋時四物湯加天門冬倍地黃冬時四物湯加

在枝倍當歸若經事欲行臍腹絞痛臨經行者血澁也四物湯
加玄胡索苦楝木香檳榔主之若氣充經脈改月事頻併臍下
多痛四物湯倍加芍藥主之若經水少而色和者四物湯倍加
熟地黃當歸主之經水過多別無餘證四物湯加黃芩白朮主
之若經水暴下四物湯加黃芩主之如臍下痛者四物湯加炒
黃連主之若經水如黑豆汁者四物湯加黃連黃芩主之若血
崩者四物湯加生地黃蒲黃黃芩主之若血臟虛冷崩中者
過多四物湯加阿膠艾葉主之若經水澁少四物湯加紅花
紅花主之且如未嫁室女有病帶下者何也病曰有三一者經
水初下陰中熱有當風扇者二者太衝脈氣盛則內熱以寒水
洗之三者乍見經行一時驚悸皆成此病當服木香琥珀當歸
沒藥各四錢乳香一錢麝香珠砂二分半為末熱水為丸如龍
眼大不拘時用溫酒化服每服五十丸諸證處方立論皆出乎前人

後之學者當懲戒哉

師厄之病其于主治

寶鑑曰師厄之病自古未有言者昔太倉公與褚澄略而論及另立方藥難比要妾之治寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則為勞孟子正謂無夫曰寡如師厄喪夫之婦欲男子而不可得慨慨成也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陰獨陽可乎若此偏者久久經閉為白淫痿逆頭風膈氣痞悶而黥瘡瘦之病診其脈極肝脈弦出寸口而上魚際究其脉源皆血盛而得經曰男子精盛則思室女子血盛則懷胎蓋男子以精為主婦人以血為主若陰陽和豈成病耶且婦人乃衆陰所集常與濕居貴乎血盛氣衰者也血盛氣衰是謂從從則百疾不生血衰氣盛是謂逆逆則災害至矣且婦人嗜慾多於丈夫生病倍於男子及其

病也。比之男子十倍難療。尤不可不改。若是四時節氣喜怒憂思飲食房勞為患者。悉與文夫同也。有如七癥八瘕九痛十二帶下產蓐乃男子所無之證。此其生病倍於男子也。又况慈戀愛憎嫉妬憂恚抑鬱不能自釋為病深固者。所以治療十倍難於男子也。由是婦人別立方焉。倘能推其所自而調之。可謂盡善盡美矣。

夜間夢與鬼交者何也

人有五臟中有七神。稟五行秀氣而生。皆承神靈所以保養若陰陽調和。則臟腑強盛。鬼魅不能傷之。若攝護失節而血氣衰。鬼邪侵傷。故婦人夢中多與鬼魅交通。由臟腑虛神不守舍。故鬼氣得萌萌也。其狀不欲見人。如有對忤。或時獨笑。或時悲泣。者是也。其源伏逆。或如鳥喙。皆鬼邪為病也。又脉來綿綿不知度數者。顏色不變。亦此候也。昔戴人曾治一婦年三十四歲。夜

夢與鬼神交驚怕異常及見神堂鬼府并構橋梁如此一十五
年竟不懷孕取祈禱無所不致鑽肌炙肉孔穴萬千黃瘦發
熱引飲中滿脚腫診其兩手寸脈皆沉而伏知胃中有痰實也
此其陽火盛于上陰水盛于下鬼神者陰之靈神堂者陰之所
舟構橋梁水之用取當三涌三泄三汗不旬日而無夢一月而
有娠戴人治効已載于書信不取矣且寡婦尼僧夜夢交通邪
氣交感久作瘕瘕或成鬼胎以按神散桃仁丸治之又有一秘
方熏藥開列于後

松脂三兩雄黃一兩

右二味為末溶化安息香和丸用瓦盆和勻如彈子大令
患人裸其身坐焙籠上四圍以衣遮蓋下用火爐燒藥一
丸熏之甚者不過五丸

○脈法

曰尺脉滑氣血實經脉不利。少陰脉弱而微微則少血。少陰脉滑而數者陰中生瘡。寸口脉浮而弱浮則為虛弱則無血。脉來至狀如琴弦苦少腹痛主月水不利。乳髮生瘡肝脉沉主月水不利腰腹痛。尺脉來時斷絕者月水不利。寸關調如故而尺脉不至者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胃臆也。經不通遠勝寒而痛其脉沉緊此由寒氣客於血室血凝不行結積血為氣所衝新血與故血相搏故痛。漏血下赤白脉遲或虛小滑者生急疾大緊數者也。崩漏下血寸口脉微遲尺脉微弦微遲為寒在上焦則吐尔。尺脉微弦主小腹引腰脊痛者必下血也。寸口弦而大弦則為減大則為耗減則為寒耗則為虛寒虛相搏病則為革婦人則半產漏下。尺脉急而弦大風邪入少陰之經女子漏自下赤。漏下赤白日下血數升脉急疾者死遲者生。尺寸脉虛者必漏血若

脉弦者不可治○左手太陽浮大為男○右手太陰沉細為女

調經通治方

大溫經湯 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行
或崩中去血過多或經損娘瘀血停留小度急痛五心煩
熱並皆治之

吳茱萸湯 炮麥門冬去心 半夏二錢

牡丹皮

白芍藥 肉桂去粗

人參

當歸去蘆

芎藭

阿膠碎炒

甘草炙

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

四物湯 菟絲衛滋氣血治月水不調脍度疔痛婦人經病或

前或後或多或少或痛不一腰足度中痛或崩中漏下或

半產惡露過多或停留不出姪娘腹痛下血胎不安產後

血塊不散或亡血過多惡露不止四物湯加茱萸煎服若

陽臟少使茱萸若陰臟多使茱萸一方加青附子治計重
不足並皆治之

熱地黃

補血如筋痛非此不能
除乃通於腎經之藥也

川芎

此治風能除肝木也如血重頭痛非
此不能除乃通肝經之藥也

芍藥

和血理脾如腹中重痛非此
不能除乃通脾經之藥也

右為籠末六煎服加減於後治婦人骨蒸加地骨皮牡丹

皮○若妊娘胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠一片

又加葱白黃芪若血臟虛冷崩中去血過多亦加膠艾○

若婦人常服養血川芎脉弦頭痛夏倍芍藥脉洪發泄○

秋倍地黃脉沉瀉血虛冬倍當歸脉沉寒而不食○若春

則防風四物加防風倍川芎○若夏則黃芩四物加黃芩

倍芍藥○若秋則門冬四物加天門冬倍地黃○若冬則

桂枝白朮加桂枝倍當歸○若血虛而腹痛微汗而惡風

四物加茂桂謂之腹痛六合○若風眩運加秦芫羌活謂之風六合○若氣虛弱起則無力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合○若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合○若虛寒脉微自汗氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒六合○若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合

○若產後虛勞日久而脉浮疾宜託明四物湯

川芎

當歸

芍藥

熟地黃各一兩半

范胡八錢

人參

黃芩

半夏麴

甘草各三錢

同煎服

○若婦人筋骨肢節疼及頭痛脉弦增寒如瘧宜治風六合或傷損氣血乘虛而暈者宜

四物湯

四兩

防風

羌活

各一兩

○若血氣上衝心腹肋下滿悶宜治氣六合

四物湯

四兩

木香

檳榔

各一兩

○若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合小腹痛同用

四物湯

四兩

玄胡

苦練

各一兩碎炒焦

○若氣衝經脉故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合

四物湯

四兩

芍藥

倍加

黃芪

一兩

○若經事欲行臍腹絞痛脂經痛者血澁也宜八物湯

四物湯

四兩

玄胡

檳榔

苦練

碎炒焦

木香

各一兩

○若經水過多別無餘證宜黃芩六合

四物湯

四兩

黃芩

白朮

各一兩

○若經水澁少宜四物湯內加葵花煎又加紅花血見愁

○若婦人虛勞氣弱咳嗽喘滿宜厚朴六合

四物湯四兩厚朴一兩枳實半兩

已上四味治法如前一證於四物湯中各加一味用之

○若經水暴下四物湯內加黃芩若腹痛加黃連如夏月不去

黃芩

○若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩

○若經水少而色和者四物湯加熟地黃當歸各一兩

○若經水適來適斷或有寒熱往來者先服小訖胡湯以去其寒熱後以四物湯和之如寒熱不退勿服四物是謂變證表邪猶有不能効也依前論中交證隨證用藥調治之

○若婦人血積者四物湯內加

廣茂 京三稜 桂 乾漆炒酒浸各一兩

○若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜八物湯

四物湯 四兩

黃芪

白朮

茯苓

甘草

各一兩

○若妊娘傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而弱

太陽經病宜表虛六合湯

四物湯 四兩

桂枝

地骨皮 錢七

○若妊娘傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊太陽經病宜表實六合

四物湯 四兩

麻黃

細辛 各半兩

○若妊娘傷寒中風濕之氣肢節煩疼脉浮而熱頭痛宜風濕

六合湯太陽標病也

四物湯 四兩

防風

蒼朮 各七錢

○若妊娘傷寒下後過經不愈溫毒發斑如錦紋宜升麻六合

四物湯 四兩

升麻

連翹 各七錢

○若妊娘傷寒胃腸滿痛脉弦少陽頭昏項強宜芎胡六合

四物湯 四兩 茈胡

黃芩 各七

○若妊娘傷寒大便硬小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本病也急下之宜大黃六合

四物湯 四兩大黃 半兩

桃仁 十箇 去皮尖 麩

○若妊娘傷寒汗下後咳嗽不止宜人參六合湯

四物湯 四兩 人參

五味子 各半

○若妊娘傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯亦治咳嗽喘滿

湯亦治咳嗽喘滿

四物湯 四兩 厚朴

枳實 各半

○若妊娘傷寒汗下後不得眠者宜枳實芍藥湯

四物湯 四兩 枳實

黃芩 各半

○若妊娘傷寒身熱大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜石膏六合湯

四物湯 四兩 石膏

知母 各半

○若妊娘傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯 四兩 茯苓 澤瀉 各半

○若妊娘傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯 四兩 琥珀 茯苓 各半

○若妊娘傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯 四兩 阿膠 艾 各半 兩一方加乾薑黃芪甘草同上

○若妊娘傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脉沉而遲少陰病

也宜附子六合湯

四物湯 四兩 附子 炮去 桂 各半

○若妊娘傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下之

四物湯 四兩 生地黃 大黃 酒洗各

○若虛熱病四物與參蘇飲相合各補心湯主之

○若四肢腫痛不能舉動宜蒼朮各半湯主之

○若燥結四物與調胃承氣湯合半名玉燭散

○若流濕潤燥宜四物理中各半湯

○若保胎氣令人有子四物與縮砂四物子湯各半名八珍湯

○若熱與血相搏口舌乾燥飲水加 瓜蘤 麥門冬

○若腹中刺痛惡物不止加 當歸 芍藥

○若血崩不止者加 蒲黃 生地黃 黃芩無一方

○若因熱生風者加 川芎 芎藭 防風無一方

○若臟秘澁者加 大黃 桃仁

○若消瀉者加 官桂 附子

○若嘔者加 白朮 人參 生薑無一方

○若發寒熱者加 乾生薑 牡丹皮 芫胡 芍藥無一方

○若大渴者加 知母 石膏

○若水停心下微吐逆者加 猪苓 茯苓 防已

○若頭昏項強者加

芎藭

黃芩

○若虛寒似傷寒者加

人參

芎藭

防風

○若產後諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服之甚効

○若婦人或因傷酒或因產亡血或虛勞五心煩熱者宜四物

二連湯

四物湯內用生

黃連

胡黃連

用溫飲清服

四物與桂枝麻黃白虎芎藭理中四逆茱萸承氣涼膈等
皆可作各半湯易老用藥大略也

○若虛煩不得睡者加 竹葉 人參

○若婦人血虛心腹疼痛不可忍者去地黃加芎藭名四神湯

○若諸膏有溫者四物與白朮相半加

天麻

茯苓

川山甲

用酒煎服

○若目暴赤發作雲翳疼滿不可忍者宜四物龍膽湯

四物湯

各半
兩 羌活

防風

各三錢 草龍膽

防已

各一錢

用水煎服

一方等分為粗末每服四錢水一盞半煎至八分去滓取
六分清者帶熱服食前若平常血氣不調及常服只用木
方日二三服○若經血凝滯腹內血氣作疼加茂木官桂
等分用之王石膏云熱地黃滯血安能止痛不若以五味
子代之○若因產後欲推陳致新補血海治諸疾加生薑
煎○若胎動不安下血每服加芟葉五七片更加葱白阿
膠末或四味之半當歸用小半如疾勢甚者以四味名半
兩細剉以水四盞熱炙一塊如鷄子大阿膠五七片煎至

二盞半去滓分作四服一月令盡一方有粉草乾薑黃芩
日二三服至二臘以一七日爲一臘以前產後每日可一
二服亦治血痢疾不止腹痛難忍宜加阿膠艾葉煎服各
六物湯如氣壅血海不調服一月不妨也○若產後被驚
氣滯種種積滯敗血一月內惡物微少敗血作病或脹或
寒胃膈脹悶或發寒熱四肢疼痛加玄胡索沒藥香白芷
與四物等分爲細末淡醋湯或童子小便酒調下○如血
風於產後乘虛發作或產後傷風頭疼發熱百骨節痛加
荊芥穗天麻香附子石膏薑香各一分四物料共一兩中
加之每服三錢水一盞煎至七分服○如寒熱往來加炮
乾薑牡丹皮各一分若平常少虛肢體疲倦月信不
調只用生薑薄荷如常服此是婦人常服之藥並家而
性緩効遲而功深○治老人風秘加青皮等分煎服○一

方治婦人腰痛作言今脉不快加熟地黄一倍

倍煎○治瘡瘕加荊芥酒煎常服○一方添訖胡冬五神

訖胡大能補虛退虛熱○一方以四物湯共四兩急細

未煉蜜為丸如梧桐子大空心米飲下三四十丸以療年

高婦人白帶又良驗也諸詳用之○一方四物湯加甘草

半兩為細末煉蜜為丸每兩作八丸酒醋共半盞煎湯同

化調停下各當歸煎去敗血生好血如人行五里再進一

丸無時候○一方劉散隨病證加減後藥煎服○血氣不

調加吳茱萸一兩甘草半兩○補下元加乾薑半兩甘草

七分○血崩淋瀝不斷加炮附子一箇赤石脂一兩○便

血及帶下加荊芥北椒○氣血滯腹內刺痛加桂○產後

傷風頭痛加石膏一兩甘草半兩○血風勞加荊芥訖胡

○潮熱加前胡乾葛黃芩人參○虛熱口乾加麥門冬黃

芩一兩○嘔吐不止加藹香白朮半兩人參一錢○產後
虛憊發熱煩悶加生地黄○產後腹脹加枳殼肉桂各三
錢○產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝○產後寒熱
往來加訖胡麥門冬各半兩○經血淋漓不斷加乾瑞蓮
房炒入藥○血滯不通加桃仁紅花各一分○產後悶亂
加茯神遠志各半兩○虛而多汗加煨牡蠣麻黃根各半
兩○妊娘心煩加竹茹一塊○如有敗血則用當歸近上
節白芍藥以赤易熟地黄以生者○一方剉散每服四錢
水一盞半煎至七分去滓食前熱服為末服亦可若常服
血氣不調平常服只用本方春加當歸夏加芍藥秋加川
芎冬加地黃各一兩半日二三服○妊娘作惡生寒面青
不思飲食憔悴加陳皮枳殼白朮茯苓甘草○產後敗血
築心地骨皮為藥○潮熱黃芩地骨皮訖胡○咳嗽桑白

皮半裏人參生薑北五味子甘草○損孕下血不止頭痛
寒熱耳鳴氣血勞傷所致黃芩荆芥生地黃赤芍藥生薑
○霍寒潮熱芫胡地骨皮白朮茯苓甘草秦艽知母黃芩
麥芽具母人參烏梅棗子○心腹脹滿枳殼青皮○霍汗
麻黃根○產後潮熱白朮北芫胡甘草牡丹皮地骨皮○
有熱黃芩○汗多浮麥○腸風下血槐角槐花枳殼荆芥
黃芩大腹皮紅內消地榆石楠葉白鷄冠花為散煎一半
為末空心鹽湯舊酒調下○鼻衄吐血竹青蒲黃藕節半
夏丁香訶子桂花紅棗飛羅麝白茅根蚌粉○蜘蛛連翹
煅蘇子紅內消白芷蘇片荆芥牛膝山蜈蚣乳香沒藥漏
蘆生地黃○血風兩脇疼痛或盤腸成塊大黃葶撥乳香
○胎動漏血不止黃芪側柏阿膠甘草續斷平常經血淋
瀝不斷或多或少或赤或白非時漏下多服有效○月水

不通野芋根牛膝紅花蘇木舊酒水同煎○臨產小腹緊
痛紅花滑石甘草燈心葵子○經閉枳殼大黃荆芥黃芩
青皮滑石木通鹽麥海金沙山梔子車前子○安胎及漏
胎下血阿膠大艾甘草蒲黃炒過○產後腹痛血塊攻腸
大艾沒藥好酒○產後病服北細辛羌活荆芥菊花甘草
木賊石決明章決明○赤眼頭風疾薄荷清茶○赤眼生
風防風黃芩○產後浮腫氣急腹大喉中水鷄聲牡丹皮
荆芥白朮桑白皮赤小豆大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生薑
葱白薄荷○月水不調血崩或多或少或前後嘔逆心膨陳
艾黃芪○血弱生風四肢痺疼行步艱難乳香人參沒藥
麝香甘草五靈脂羌活獨活防風荆芥地龍南星白附子
澤蘭為末蜜丸木瓜鹽湯下○血氣膨脹甘草大香枳殼
馬兜鈴等分紫蘇香地黃空公服○補血住崩百草霜

煨灰首綿灰蒲黃炒過龍骨白薑○血成片地黃藕節○
黑血片人參白朮○白淫濁龍骨○地黃當歸○五色研
麝香好酒○鮮紅溫酒鹽湯○風瘡赤腫荆芥牛旁子何
首烏甘草防風羌活地黃鹽酒○帶下肉桂蒲黃百草霜
甘草黑豆白朮玄胡索白薑龍骨空心鹽酒○血寒甘草
烏梅范胡桃柳枝○感風勞嗽欬花知母阿膠半夏麻黃
甘草馬兜鈴黃芩杏仁范胡薑錢訶子烏梅○月經久閉
肉桂甘草黃芪薑錢棗子木通紅花○大便下血四肢寒
膨脹及腸胃有風槐花枳殼漏蘆荊芥木香白鷄冠花木
通紅內消紫草石榴皮陳皮黃芩青皮甘草白茅根槐角
○瘰癧人參川芎白芷蒲黃炒阿膠白朮萊菔續斷乾薑
黑附子肉桂黃芪赤石脂甘草麝九鹽梅湯下○白帶用
白龍骨酒○胎前產後痢後風乳香龍骨桑葉木香肉桂

蒼木牡丹皮白薇人參甘草澤蘭大椒面香煉蜜為丸不
瓜酒下○治帶下赤白痢陳米飲○心腹脹炒薑酒○血
氣交醋湯○渾身勞倦為末炒薑酒陳青蒿鹽和調下○
犀角四肢黃甘草牡丹皮澤蘭白薇蒼木桂心面香蜜丸
鹽湯溫酒下○嘔逆飲食不入加白木丁香甘草人參縮
砂益智仁胡椒○經行腹痛腰痛背痛芸薑牛膝紅花吳茱
萸菴蘭并草銀器燈心熱服○虛渴人參乾葛烏梅瓜蔓
根○受胎小腸氣痛木香茴香○胎前嗽枳殼甘草款花
知母為堯鈴半夏不通導產人參苦梗麥門冬○腳腫失
履皮赤小豆茯苓皮生薑皮○產後不語失音訶子人參
紗蜜百藥煎○陰陽交合經脉行赤石脂黃芪肉桂百草
霜敗棕灰肉豆蔻當歸木香龍骨白朮茯苓地榆藕節○
胎氣衝肝腰脚痺行步艱難枳殼木通甘草建醅荆芥地

黃耆活獨活山梔子燈心空心服○氣築小腹痛玄胡索
煎服○陳氏經驗方云吳興周端仁郎中頃赴省試照臨
一隣某本醫家凡婦人百病只以四物湯加茱萸煎不
効者產難及胎衣不下平死腹中入酒同煎凡用有効謹
以此為報此藥不知起於何代或云自魏華佗匕之術獲
微方類單省傳稱陀鍼灸不過數處千金方云自三代以
來醫方藥論未有如此詳備其間有漢晉名公諸方今產
實方乃宋梁時節度趙官督齊所撰其中有四物散後脩
入聖惠方自後醫者易散為湯善用者若馭良馬當隨意
無不得所至焉命名醫於四物中增損品味隨意虛實寒
煖皆得其要者然亦非止婦人之疾可用而已

逍遙散

治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

託胡二

白朮

茯苓去皺各當歸去薑

芍藥

半錢

甘草

右作一服水二鍾煎薑五片煎至一鍾不拘時服

加味吳茱萸湯

治衝任衰弱月候愆期或前或後或崩漏不

止赤白帶下小腹急痛每至經脉行時頭眩飲食減少氣

滿心怯肌肉不澤悉皆治之

吳茱萸

當歸

官桂

北細辛

半夏

麥門冬

乾薑

白茯苓

苦梗

南木香

防風

牡丹皮

甘草

各一

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食前服

桃仁散

治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水

四體疲倦不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來多思酸物

桃仁

半夏

當歸

川牛膝

桂心

人參

蒲黃

牡丹皮

川芎

澤蘭葉各一錢

赤芍藥

生地黄各一錢

粉草半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

薑黃散 治血脈久冷月水不調臍腹刺痛

薑黃片一錢

白芍藥各二錢

玄胡索

牡丹皮

當歸各半錢

蓬朮

紅花

桂心

川芎各一錢

右作一服水二鍾酒半鍾煎至一鍾不拘時服

紫石英丸 治婦人月經不調乍多乍少或前或後時發疼痛

紫石英細研 川烏炮

杜仲細去

禹餘糧煨醋淬

遠志去心

桂心

澤瀉

桑寄生

龍骨別研 當歸 人參 肉蓯蓉酒浸

石斛 乾薑炮 五味子 甘草炙各一兩

牡蠣煨 川椒去目并合口者不用炒出汗各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸食前用米

飲湯送下

吳茱萸湯 治婦人素虛又為風冷乘氣停滯腰脇刺痛

吳茱萸湯洗三遍 當歸去蘆二錢 桔梗去蘆 細辛去苗

防風去蘆 乾薑炮 熟地黃半二錢 甘草炙半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

椒紅丸 治婦人血氣不調臟腑積冷臍腹病痛肌體日瘦

椒紅 沉香 當歸去蘆 訶梨勒煨去核

蓬朮 附子炮去皮 白朮各一兩 麝香別研二錢

肉豆蔻 良薑 丁香各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下

暖宮丸 治衝任虛損下焦久冷月事不調不成孕育崩漏下血赤白帶下並皆治之

生硫黃 六兩 赤石脂 火版 海螵蛸 附子 各三兩

禹餘糧 九兩 火版 醋汁

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒或醋湯送下

救急甲九 治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結硬時發刺痛漸成勞狀

鼈甲 醋炙 桂心 三棱 醋炙 牡丹皮

牛膝 去苗 琥珀 訶子 取肉 桃仁 去皮尖雙

土瓜皮 大黃 煨各

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服十五丸食前用桃

仁湯送下

當歸散 治血脈不通

當歸

川山甲

灰炒

蒲黃

炒各半兩

辰砂

另研一錢

麝香 少許

右為細末研勻每服二錢食前熱酒調下

紅

當歸散

治婦人血脈不通或積

不調或斷續

女月水不

不定時作腰痛腰膝重疼攻刺小腹

通並皆治之

紅花

紫葳

牛膝

白芷

蘇木

桂心

半錢

當歸

劉寄奴

各二錢

赤芍藥

三錢

甘草

半錢

右作一服水一鍾酒一鍾同煎至一鍾

服

人參荊芥散 治婦人血風發熱身體疼痛頭昏目眩煩渴盜

汗或月水不調臍腹疼痛痲痺塊硬並皆治之

人參 去蘆

荊芥穗

赤芍藥

龜甲 醋浸去

訶胡 去苗

牡丹皮

羚羊角

酸棗仁

枳殼 炙炒

白朮

肉桂 去粗

生地黃

防風 去蘆

當歸

芍藥

甘草 各八

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

伏龍肝散

治血氣勞傷衝任脉虛經血非時注下或如豆汁

或成血片或五色相雜臍腹冷痛月經不止

伏龍肝

麥門冬 去心

赤石脂 略

一熟地黃

艾葉

炒各一

當歸 去蘆

川芎 各二

肉桂 皮去粗

乾薑 炮

甘草 各半

右作一服水二鍾紅棗二枚煎至一鍾食前服

滋血湯 治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或為浮腫肌

體發熱疑為勞瘵

馬鞭草

荊芥穗

牡丹皮

肉桂去皮各

赤芍藥

川芎

當歸去蘆各 枳殼去穢炒各

右作一服水二鍾為搗一箇煎至一鍾食前服

牡丹散 治婦人血熱氣虛內損月水不行外發潮熱肢體羸

困漸成骨蒸並宜治之

牡丹皮

芍藥

玄胡索

蓬莪朮

乾漆

當歸

烏藥各

鬼箭草

陳皮

沒藥研

蘇木

紅花

桂心

甘草各半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

六神湯 治血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進飲食

川芎

當歸

白芍藥

熟地黃

黃芪

地骨皮各二

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

大腹皮飲 治婦人血癰單腹痛

大腹皮

防己

木通

桑白皮

厚朴

瓜蒌

黃芪

陳皮

枳殼麩炒

大黃蒸各一錢

青皮半錢

五味子半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾入酒半盞再煎一二沸去滓

食前服

異功散 治婦人血氣虛冷時發刺痛頭目昏悶四肢無力寒

熱往來狀似勞倦並宜服之

烏藥

川芎

苦梗

玄胡索

當歸

陳皮各半

官桂

牡丹皮

芍藥

白芷

乾薑各一

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾入酒半盞再煎一二沸不拘時

玄胡索湯

治婦人室女七情所感血與氣併心腹疼痛或連

腰脇甚作搐搦一切血氣經候不調並宜服之

玄胡索

蒲黃

赤芍藥

片薑黃

當歸

去蘆各半乳香

木香火不見

官桂火不見

沒藥

各一甘草半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

六合湯

治婦人經事一行腹中結塊腰腿重痛

川芎

當歸

白芍藥

熟地黃

官桂

蓬朮各二

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

溫經湯 治婦人血海虛寒月水不調

川芎

當歸

芍藥

蓬朮

各半

人參

牛膝

桂心

牡丹皮

各半

甘草 半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

人參白朮散

治婦人血虛身燥溫相搏玄府緻密心煩忪悸發渴飲

食進少不為肌膏

人參

石膏

滑石

生地

黃芩

薄荷

黃芩

炒仁

藿香

各半

茯苓

白朮

甘草

半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

柏子仁湯

治婦人憂思過度勞傷心經不能藏血遂致崩中

下血不止

補子仁炒

香附子炒去萸筋

鹿茸酒洗去毛

茯神去皮

當歸各半錢

阿膠

小草各一錢

川續斷二錢

甘草炙半錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾空心服

白朮散

治婦人脾胃氣虛小腹脹滿四肢無力不欲飲食

白水

赤茯苓

厚朴各半錢

訶子肉

草蓼

桂心

檳榔

人參

陳皮

各一錢

耳草半錢

右作一服水二鍾生薑三片棗一枚煎一鍾不拘時服

八珍散

調和榮衛順理陰陽滋養血氣進美飲食

人參

白茯苓

白朮各半錢

熟地黃

川芎

芍藥

當歸各二錢

甘草炙半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾食前服

五燭散 治婦人傷寒發熱胃腹滿痛血氣不通

川芎

芍藥

當歸各二錢

熟地黄各一錢

枳實

朴硝

厚朴各二錢

大黃三錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

滋血湯 治婦人心肺虛損血脈虛弱月水過期

人參

山藥

黃芪各一錢

白茯苓去皮

川芎

當歸

白芍藥

熟地黄各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

增減四物湯 治婦人血積

川芎

當歸

熟地黄

乾漆炒烟

芍藥

京三稜

蓬水各半

官桂一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

麥前散 治少男室女骨蒸婦人血風攻注四肢心胃煩滿

鼈甲

醋炙

乾漆

常山

大黃

煨各

白朮

訖胡

生地黄

赤茯苓

當歸

石膏

各半

甘草

半錢

右作一服水二鍾小麥一百粒煎至一鍾食前服有盜汗

加麻黃根一錢同煎

桂枝桃仁湯

治婦人月事不通小腹膨脹疼痛

官桂

生地黄

各二

芍藥

二錢

桃仁

半錢

甘草

半錢

右作一服水二鍾生薑三片棗一枝煎至一鍾食前服

增損四物湯

治月事不調心腹疼痛補血溫經注頤

川芎

當歸

芍藥

熟地黄

牡丹皮

白朮

各半

地骨皮

一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

大玄胡索散 治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘悶或癥瘕

癖塊及一切心腹暴痛

玄胡索 赤芍藥 川練子去核 蓬莪朮煨

京三棱煨 厚朴薑製 當歸 黃芩

川芎 桔梗 檳榔各一錢 木香

官桂去皮 甘草各半 大黃二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

牡丹散 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮 川大黃 赤茯苓 生地黃

赤芍藥 當歸 白朮各一錢半 桃仁

官桂 石葦 木香各一錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

黃芩散 治婦人熱勞羸瘦四肢煩熱心燥口乾不欲飲食

黃芪

地骨皮

赤茯苓

麥門冬

生地黃

赤芍藥

人參

黃芩

當歸

芫胡

甘草

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

麥門冬散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

麥門冬

赤茯苓

赤芍藥

芫胡

桑白皮

生地黃

黃芪

羚羊角屑

甘草

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

犀角散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

犀角屑

赤芍藥

地骨皮

赤茯苓

紅花

人參

枳殼

麥門冬

芫胡

黃芪

甘草

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

地骨皮散 治婦人血風氣體羸弱寒熱發渴

地骨皮 桑白皮 枳殼 前胡

黃芪錢各半 白茯苓 五加皮 白芍藥

人參錢各一 芫胡二錢 官桂 升草錢各半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

滋血湯 滋養榮血補婦人諸虛治血海久冷

當歸半錢 川芎 麥門冬 牡丹皮

人參 芍藥 琥珀別研各錢 半夏錢

官桂 阿膠炒 酸棗仁 甘草錢各半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

大腹皮散 治婦人風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹皮 紫蘇 木通 桑白皮

羌活

荆芥

芍藥

青皮

木瓜

獨活

枳殼

二錢

右作一服水一鍾生薑五片葱白一莖煎一鍾不拘時服

桑白皮散 治婦人腳氣感發兩腳浮腫小便赤澀腰脇脹滿

氣急坐卧不得

桑白皮

郁李仁

木通

檳榔

青皮

木香

防己

大腹皮

赤茯苓 二錢 紫蘇子 一錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

神祕湯 治水氣乘肺而喘及治支飲喘滿

橘皮

桑白皮

紫蘇

人參

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾食前服

芎藭散 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北芪胡

赤茯苓

黃芩

白木

麥門冬

三錢

鼈甲

二錢

人參

地骨皮

枳殼

炒

生地黃

桑白皮

赤芍藥

桔梗

甘草

各半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

黃芪散

治婦人客熱心胃壅悶肢節煩疼不思飲食

黃芪

生地黃

各二錢

人參

茯神

各半

犀角屑

瓜蒌仁

黃芩

各一錢

甘草

半錢

右作一服水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

瑞金散

治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐疼痛

玄胡索

牡丹皮

紅花

各一錢

片薑黃

二錢

赤芍藥

蓬莪朮

川芎

當歸

各半

官桂半錢

右作一服水一鍾酒一鍾同煎至一鍾食前服

牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛不思飲食

牡丹皮 玄胡索 官桂各一 京三稜

當歸各半 蓬莪朮 赤芍藥 牛膝各二

右作一服水一鍾酒一鍾煎至一鍾食前服

石筆散 治婦人小便赤熱淋瀝

石筆 黃芩 瞿麥穗 榆白皮

木通 葵子各半 甘草半

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

神授湯 治上氣喘急不得卧

橘皮去白 桔梗 紫蘇 人參各二

北五味半

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

人物湯 治經事欲行臍腹絞痛臨經痛者血澁也

川芎

當歸

芍藥

熟地黃各二錢

木香

檳榔

玄胡索

苦練各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

旋覆花湯 治婦人心胃嘈雜中脘痰飲冷氣心下汪洋口中

清水自出腹脇急脹滿痛不欲飲食

旋覆花

人參

桔梗

白芍藥各一錢

橘皮去白

赤茯苓

半夏各二錢

官桂去皮

細辛

甘草各半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

小芩胡湯 治婦人傷風續得寒熱發作有時經水適斷此為

熱入血室其血必結致如瘕狀

芩胡 三錢

半夏

黃芩各二錢

生地黄

人參各半 甘草半錢

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾不拘時服

黃芩芍藥湯 治婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食

黃芩 白芍藥 白朮 生地黃各半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

三黃瀉心湯 治婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩躁

譫語目赤毒氣閉塞不通

大黃五錢 黃芩三錢 黃連二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

竹茹湯 治婦人病未平復汗血吐血衄血下血

竹茹 人參 白芍藥 熟地黃各二錢

川芎 桔梗 當歸各一錢 桂心

甘草半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

青竹茹湯 治婦人病未平復因有所動致熱氣上衝口手足拘急搐搦如中風狀

青竹茹 二錢 瓜蒌根 五根

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

當歸白朮湯 治婦人病未平復因有所動小腹急痛腰膝疼

四肢不任舉動無力發熱

當歸

白朮

桂枝

芍藥

人參

黃芪

甘草

各半

附子生用

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

乾薑芤胡湯 治婦人經脉初來方斷傷寒寒熱如瘧狂言見

尾並宜服之

乾薑

杜蘅

桂枝

各一

瓜蒌根一錢

芫胡三錢

甘草半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

凌霄花散

治血瘀血塊及產後惡露不盡兒枕急痛應手積聚

聚瘀痛漸成等症悉皆治之

凌霄花

半錢二錢研砂

桃仁另研

玄胡索

紅花

當歸

官桂去皺各

紅娘子酥一

血竭

紫河車

赤芍藥

山梔子仁

沒藥

地骨皮

加皮

牡丹皮

甘草略二

右為細末每服二錢食前溫酒調服

內補當歸丸

治血氣虛損月水不調或崩中漏下失血過多

肌體羸困及月水將行腰腿重痛並皆治之

當歸去蘆

阿膠化

白芷

續斷

乾薑炮

芎藭

甘草炙各四兩

熟地黄焙兩

附子炮去

白芍藥

肉桂各二兩

吳茱萸湯泡

白朮酥三

蒲黃炒錢

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫

酒送下

熟乾地黄丸

治婦人風塵勞冷胃弱米穀不化或腸虛受冷

大便時泄或月水不調淋瀝不止或閉斷不通結聚癥瘕

久不成胎一切諸虛之證並皆治之

熟地黄

五味子

各半兩

牛膝去酒

芎藭

禹餘糧醋炒

白茯苓去皮肉 菴蓉酒浸

卷柏去根

山藥

厚朴去皮

乾薑炮

白芷

細辛去苗

防風一兩

赤石脂二兩

杜仲去皮

蕪荑炒

人參去蘆

川椒去目并

蛇床子

艾葉炒

續斷各半

紫石英煨研

石膏

各二兩當歸去蘆炒澤蘭去梗

官桂去皮各二兩

石斛

錢一兩一分甘草七錢半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫

酒或米飯送下

禹餘糧丸

治血虛煩熱月水不調赤白帶下漸成崩漏

禹餘糧

醋火炒白石脂各二兩

附子炮去

鼈甲去垢

桑寄生

白朮

厚朴去皮

當歸去蘆

栢葉炒

乾薑炮各

白芍藥

狗脊去毛各

吳茱萸

湯泡焙

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫

酒或米飲湯送下

神仙聚寶丹

治婦人血海虛冷外來風寒搏結下散積聚成

塊血氣攻注腹痛疼痛及經候不調崩中帶下並宜服之

沒藥另研 琥珀另研 木香根取 當歸酒洗焙取

辰砂另研 麝香另研 滴乳香另研

右研勻滴水為丸每兩作十丸每服一九空心溫酒磨一

詭詭丸 治婦人衝任虛寒胎孕不成就多損隨

澤蘭葉 白木各半 肉桂去皮 乾薑炮

白芍藥 石斛 當歸酒洗 熟地黃酒洗

玄胡索 牡丹皮 川芎各

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒送下

紫蘇散 治婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡不思飲食脚膝痠

腫並皆治之

紫蘇葉 木通 桑白皮 茴香根

枳殼二兩

羌活

獨活

荊芥穗

木瓜

青皮

各半兩

大腹皮

十箇

甘草

半兩

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片薄荷一葉煎至七分

夫滓溫服佳

濟陰丹

治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血冲心中風

口噤子死腹中劈開口灌藥須臾生下便得無恙治墮胎

腹中收刺疼痛橫生逆產胎衣不下血暈血癖血崩血滯

血入四肢一應血臟有患及諸種風氣或傷風吐逆咳嗽

寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脈不調赤白帶下乳生

惡氣胎前產後諸症胎前崩中不定因此成疾室女經脈

不通並宜服之常服煖子宮和血氣悅顏色退風冷能消

除萬病

三稜二兩

蓬朮

片一兩

蒼朮

去皮

枳殼

去核

枳殼

去核

大艾 去粗

劉寄奴

香附子 淨

敗醬 各一兩半

烏豆

三升合口上九味以穀醋

當歸身 酒蒸

摘皮

去粗白芍藥 各一兩半 蒲黃 炒

牡丹皮 去骨

官桂 去粗

赤芍藥

片薑黃

青皮 去白各

生地黄 酒浸熟地黄 酒浸

川芎 各半

玄胡索 炒

五靈脂 酒煮 白木 煨

右為細末以糯米粉穀醋打糊為丸如梧桐子大每服五

十九空心沉香湯送下蘇湯煎湯下亦可

南嶽魏夫人濟陰丹

治婦人血氣久冷無子及數經墮胎皆

因衝任之脉虛損胞內宿挾疾痛經水不時暴下不止月

內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下

冷痛小便白濁已上諸疾皆令孕育不成以致絕嗣此藥

治產後百病百醉內常服除宿血生新血令人有子亦並

子充實亦治男子亡血諸疾

木香炮

京墨炮

茯苓

桃仁

去皮尖
各一兩

壁布鹿

藁本

秦朮

石斛

酒浸

桔梗炒

人參

甘草各二兩

牡丹皮

去心

乾姜炮

細辛

桂心

當歸

川芎

各半

蒼朮

米泔浸

大豆卷

炒半

川椒

去目并合

山藥

各三兩

澤蘭葉

熟地黃

酒洗

香附子

炒各四兩

糯米炒一

右為細末煉蜜和丸每兩作六丸如彈子大每服一九細

酒溫酒送下淡醋湯化服亦可空心食前服一方山藥川

椒各三兩或以醋糊為丸如梧桐子大每服五十九依前

服亦可

妙應丹 治婦人痰疾無所不治

晚蠶沙

鯉魚鱗燒為當歸去蘆

石膏煨研

澤蘭去梗

附子皮去

木香二兩

熟地黃酒洗

防風去蘆

蕪荑炒

馬牙硝

栢子仁別炒

川芎

人參

黃芪

蟬蛻洗去足

白薇

檳榔不見

川椒微炒各

吳茱萸湯洗

紅花炒各

藁本去苗

白薑炮

厚朴去粗皮

甘草炙各

右為細末煉蜜搜和并數千下丸如彈子大每服一九○
血瘀塊病綿灰酒下○催生細嚼溫酒下○血勞血虛枯
梗酒下○血崩棕櫚灰酒下○血氣痛炒白薑酒下○血
風荆芥酒下○血暈悶絕胎死腹中胞衣不下並用生地
黃汁童子小便酒各一盞煎二沸調下○常服醋湯溫酒
化下並空心食前服

烏雞煎丸

治婦人胎前產後諸般疾患並皆治之

烏雄雞一隻

烏藥

石床

牡丹皮

人參

白朮

黃芪

各一兩

蒼朮

採汁兩分

海桐皮

肉桂

去粗

附子

炮去

白芍藥

蓬莪朮

川烏

炮

紅花

陳皮

各二兩

玄胡索

木香

琥珀

熟地黃

洗焙

肉苁蓉

草藥

各半兩

右細剉用烏雄雞一隻湯擇去毛及腸肚將上件藥安放

雞肚中用新磁瓶以好酒一斗同煮令乾去雞骨以油單

盛焙乾為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九○胎

前產後傷寒蜜糖酒下○胎前氣悶壯熱必薑酒下○赤

白帶下生薑地黃酒下○產後敗血注心童子小便炒薑

酒下○產後以塊填築心腹疼痛玄胡索酒下○胎前嘔

逆薑湯下○作生炒蜀葵子酒下○安胎鹽酒下○寒女
經脉常通不道四肢疼痛煎紅花酒下○血氣攻刺心腹
疼痛煎當歸酒下○血暈棕櫚燒灰酒調吞下○血邪研
硃砂麝香酒下○血悶煎烏梅湯研硃砂下○子宮久冷
溫酒或薑湯下空心日一服○血風勞人參酒吞下○小
腹疼痛炒茴香鹽酒吞下○血散四肢遍身虛浮黃腫赤

小豆酒下○常服溫酒醋湯任下並空心食前服

小白薇丸 治婦人衝任虛損子藏受寒久無子息又斷續不
產此由上熱下冷百病滋生或月水崩下帶漏五色腰腹
疼重面黃肌瘦或因產乳不能將護路而太早或久坐濕
地或冷風從下入血藏既虛風邪內乘或月水當行失於
調攝傷動胞絡陰陽不和上焦虛陽壅燥下藏邪令結伏
致使胎孕不成冷極傷敗月水不勻飲食減少夜多盜汗

面黧黯齒無髮落脚膝疼重舉動少力並宜服之

覆盆子

去梗

菖蒲

微炒

遠志

去心

桃仁

去皮尖炒黃

白茯苓

去皮

葉本

去苗

卷柏

去根

肉桂

去粗皮

人參

白芷

各三分

白龍骨

川椒

去目并合口者炒出汗

白薇

去苗各一兩

乾薑

炮

細辛

去苗

蛇床子

炒

當歸

去蘆

車前子

芎藭

各半兩

熟地黄

麥門冬

去心糖一兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫

酒或米飲送下此藥常服壯筋骨益血氣煖子宮除風冷

令人有子

白聖丹

治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡風怯寒

咳逆煩滿抑息短氣心脇腰背肚腹與子宮相引痛漏下

五色心常恐懼遺志怒憂勞即發皆是內傷所致

白芷

杜蠟烟研

細辛

禹餘糧醋火炒

龍骨烟研

附子炮去

石葦去毛

烏賊魚骨酒

黃連去毛

茯苓去皮

肉桂去粗

瞿麥穗

白欬

芍藥

白芷

白石脂煨

當歸去苗

乾薑炮

人參

甘草炙各

川椒去目并口者

出河半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫

酒送下一方無人參

琥珀澤蘭煎

治婦人三十六種血氣八風五痺七癥八瘕心

腹刺痛中風癰瘕手足痠疼乳中結聚妊娠胎動胎死不

出產衣不下敗血漬心頭旋暈花血症四肢渾身浮腫衝

任久盈純產無嗣早晚服食或因有子經脈不調赤白帶

下惡心嘔逆身疲倦懷入月一日一服消胎易產

琥珀

澤蘭葉去梗壯丹皮去心

紫巴戟去心

茴香

五味子去梗五加皮

劉寄奴草去枝

白芷

川當歸酒浸赤芍藥

金釵石斛酒去根

川芎

白芍藥

生地黃洗焙

熟地黃洗焙

人參

附子

艾葉醋炒糯米糊調成餅

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前用溫酒磨

化服○漏胎刺痛黃糯米飲下○寒熱往來四肢煩疼煎

青蒿酒下○婦人室女經閉煎紅花酒下○血暈不省人

事童子小便和燉酒下○催生鷄子清和酒下○血氣血

塊攻刺心腹燒研錢淬酒下○傷寒又中風尸禁煎麻黃

湯下以被蓋出汗即愈○心驚悸又頭疼薄荷酒下○咳

嗽煎桑白皮湯下○血風攻注澤身癢痒頭面麻痒炒異

豆浸酒下○產後常服不生諸疾甚効

加味五積散

蒼朮

六兩米泔洗

白薑

陳皮

各一兩

厚朴

去粗皮

半夏

枳殼

楊芍藥

香附子

炒去毛

桔梗

人參

去花

茯苓

去皮

川白芷

川芎

當歸

去土

茴香

炒

木香

肉桂

粉草

各一兩

右剉碎生薑木瓜入鹽煎服○陰經傷寒生薑附子○血
脈不勻紫蘇○氣嗽烏梅薑蜜○勻經麥子薑錢○補益
血海蘇鹽○產後生薑醋炒陳艾○胃冷不納食陳皮縮
砂○赤白帶陳米○冷氣疾木香茱萸○心燥背筋急頭
暈腰脚痠生地黃當歸○脾虛蘇葉粉草月中被驚或因
爭觸心頭結塊五疳五噎箇青棗子○口苦舌乾吞酸噯
氣此為胃冷生薑鹽○腰痛挑仁木瓜杜仲川續斷○身

疹秦花○諸腫脾胃不和羸瘦冷氣蘇藍○冷瀉必過生

薑烏梅肉豆蔻陳皮各煎湯下

萬應紫苑丸 療臍腹久患痼癖如梳大及諸黃病每地氣起

時上氣衝心逆脐絞痛一切蟲咬十種水病十種蟲病反

胃吐食嘔逆惡心飲食不消天行時病婦人多年月水不

通或腹如懷孕多血天陰助發又治十二種風頑痺不知

年歲晝夜不安夢與鬼交頭白多屑或哭或笑如鬼魅所

以 著腹中積聚腹痛及治小兒驚癇大人癲狂一切風及無

孕婦人身上頑麻狀如蟲行四肢俱腫呻吟等疾並皆治

之功效不可具述

紫苑去苗 蛇胡去頭 蒼蒲 吳茱萸去核

厚朴去皮 桔梗去盡 茯苓去皮 皂角去皮

黃連去皮 桂枝 乾薑八分 川烏炮去皮

羌活去蘆

獨活去蘆

防風去蘆

巴豆

去皮膜
油研

人參去蘆

蜀椒

去目并合口者
出汗各半兩

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三九漸加至
五七丸食後臨卧生薑湯送下初有孕者不宜服○痔漏
腸風酒下○赤白痢下○下血痢米飲湯下○墮
傷血悶四肢不收酒下○細虫咬心積柳湯下○氣噎
噎荷葉湯下○打撲傷損酒下○中毒蒂灰甘草湯下○
一切風疥麻湯下○寸白虫積柳湯下○霍亂乾薑湯下
○咳嗽杏仁湯下○惡賢痛五淋酒下○陰毒傷寒溫酒
下○吐逆生薑湯下○食飲氣塊麴湯下○特氣井花水
下○脾風陳皮湯下○頭疼水下○心痛溫酒下○大小
便不通燈草湯下○用物所傷以本物湯下○吐水藜蘆
湯下○氣病乾薑湯下○小兒天風吊搐防風湯下防已

亦可○小兒疳積煎白湯下○小兒乳食傷白湯下○月信不通煎紅花酒下○婦人腹痛川芎湯下○懷孕半年後漏胎艾湯下○有子氣衝心酒下○產血暈溫酒下○血氣痛當歸酒下○產後心腹脹滿且淋湯下○難產益智湯下○產後血崩當歸湯下○赤白帶下酒煎艾湯下○解內外傷寒粥飲下○室女血氣不通酒下○子死焚手湯下

沉香煎丸

沉香 二兩 半

丁香 一兩

麝香 二兩

白朮 百兩

官桂

乾薑

縮砂仁

白芷莖

檳榔

各五兩

青皮

南木香

肉苁蓉

胡椒

人參

生薑屑

訶子肉

陳皮

苧草

各半兩

右為細末煉蜜和丸如棗子大每服一丸細嚼生薑湯下
溫紅酒亦可空心食前日進三服

內炙散 治婦人產前產後一切血疾血崩血瘕腹脇滿痛氣逆
嘔吐冷血冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下五色腹中
雷鳴氣滿腹脹瀝血腰痛口吐清水顫產血衰顏色青黃
勞傷劣弱凡水不調下血墮胎血迷血暈血厥時發疼痛
頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不乾體虛多汗手足
逆冷並宜服之

茴香

藿香

丁皮

熟地黄洗焙

肉桂

去皮各一兩半

川芎

葉本

黃芪去蘆

乾薑

炮各二兩

木香

一兩

陳皮

去白四兩

白芍藥

十兩

當歸

去蘆

山藥

白芷

白朮

甘草

炙赤各八兩

右為末每服三錢水一大盞入生薑五片艾一團同煎至七分空心食前熱服溫酒調亦得○如產後下血過多加蒲黃煎○惡露不快加當歸紅花煎○水瀉加肉苳蔻末煎○嘔吐加藿香生薑煎○上熱下冷加荆芥煎○但是腹中寒冷血氣不和並宜服之產後每日一服則百病不生丈夫虛冷氣刺心腹疼痛尤宜服之

勝金丸

治婦人久虛無子及產前後一切病患兼治男子下

虛無力此藥能安胎催生妊前臨月服五七丸產時減痛婦人無子畏子宮冷如服二十丸男女自至又治積年血風脚手麻痺半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結痛吐逆心痛子死腹中繞臍痛氣滿煩悶失蓋汗不出月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便不禁中風不語口噤產後喘咳消渴眼前見鬼迷暈敗血上衝寒熱頭

痛面色痿黃淋瀝諸疾血下無度血痢不止飲食無味產後傷寒虛煩勞悶產後血癖產後羸瘦凡婦人衆疾不問年深日近並宜服之一方名不換金丸治婦人諸虛不足心腹疼痛

藥本

當歸

石脂

赤白可

白芍藥

人參

白薇

川芎

不見火

牡丹皮

桂心

白芷

白朮

米泔洗

白茯苓

玄胡

沒藥

甘草

炙各一兩

江西安撫司沒藥甘草各半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九溫酒化下初產了用熟醋湯下食前服此方係王承宣惠祖傳渠家凡婦懷身便服此藥甚有神効常服尤妙係在京師於能家傳一方有沉香無沒藥一方有附子無沉香

龍骨散

治腹下

十二經絕產

一曰白帶二曰赤帶

三曰經水

不利四曰陰胎五曰子藏堅六曰藏瘕七曰陰陽虛痛八
曰內強九曰腹寒十曰藏閉十一曰五藏酸痛十二曰夢
與鬼交並宜服之

龍骨

三兩

半夏

黃蘗

竈中黃土

桂心

乾薑

各二兩

石葦

滑石

各一兩

烏賊魚骨

代赭

各四兩

白殭蠶

五枚

石治下篩酒服方寸七日三白多者加烏賊骨殭蠶各二

兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃隨二兩子藏堅加乾

薑官桂各二兩已上多病增之服藥三月有子即住藥

太過多生兩子當審方取好藥寡婦童女不可妄服

穀血丸

治婦人血海虛冷百病變生氣血不調時發寒熱或

下血過多或久閉不通崩中不止帶下赤白殭瘕癰塊攻

刺寒痛小便澀滿脇肋脹痛腰重脚弱面黃體羸飲食減

少漸成勞狀及經脉不調胎氣多損產前產後一切病患無不治療

菊花 去梗

茴香

延胡索 沙

香附子 炒酒洗

肉桂 去粗

當歸

芍藥

熟地黄

牛膝

蒲黃

蓬朮 各三

右為細末用烏豆一升醋煮候乾為末再入醋二碗煮至一碗留為糊丸如梧桐子大每服二十九溫酒或醋湯送下血氣攻刺炒薑酒下噤瘕絞痛當歸酒下忌鴨肉羊血此藥緩子宮令人有子及治殺血損調銜任暖血海及胞絡傷損宿痰乾血

烏喙化 治腸覃病因寒氣客于腸外與胃氣相搏正氣不榮

繫瘦內著惡氣乃起其生也始如鷄卵久久乃成狀如懷

胎按之堅推即移月事時下故曰腸覃亦治乳餘疾大小

便不利并食有伏虫腫脹癰疽毒腫久寒邪氣

烏喙炮去皮二錢半炙湯炮石膏煨肉苁蓉酒浸

藜蘆炒牡蠣各一錢乾薑炮桂心各一錢

巴豆七箇

右為細末研勻煉蜜和丸如棗豆大每服三五丸食後溫

酒米飲任下亦治男子疝痛

卷栢丸 治婦人衝任本虛血海不足不能流通經絡月水不

調赤白帶下三十六疾並皆治之常服和經絡養五臟潤

肌膚長髮去黥除風令人有子

卷栢去粗芎藭洗焙艾葉炒各熟地黃洗焙

川芎 白芷 栢子仁微炒肉苁蓉

牡丹皮各一兩

右為細末煉蜜和丸如梧栢子大每服五十丸用溫酒或

米飲送下空心食前服

溫白丸 治婦人諸疾繼續而生帶下淋瀝五邪失心憂愁思

慮意思不樂飲食無味月水不調及腹中一切疾病有似

懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭者或如鬼所使但服

此藥無不愈者

桔梗 訖胡 葛蒲 吳茱萸湯泡七次洗

紫花去苗 黃連去毛 肉桂去粗皮 厚朴去粗皮

人參去蘆 茯苓去皮 皂角去皮炙 蜀椒去目并合口炒出汗

巴豆去皮心腹出油 川烏炮去皮 附子炮去皮

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三丸漸加至

五七丸食後臨卧生薑湯送下

義木散 隨證斟量加入

義木煨 川芎 當歸去尾 熟地黃酒蒸

白芷

茴香

楊芍藥

甘草

各一

右為細末每服二錢鹽酒調下○月水不調銀器燈心○
安胎黃芪生地黃○氣聖調氣生薑紅棗○遍身腫當
歸酒○小便不通滑石末○心虛硃砂研末調○敗血冲
心腹寒如刀刺燒秆鐵紅淬酒如不退五靈脂酒○血閉
身疼炒薑酒○吐酸水丁香七粒煎湯○血風上攻眼目
浮腫荆芥○小腹痛木瓜○渾身浮腫薑湯或蔥湯○胃
虛惡心藿香○頭面腫赤豆荊芥湯下○血不止木香湯
○冷嗽桑白皮乾柿○頭痛川芎細辛○血風潮熱生薑
紅棗○出汗麻黃根○吐不止青陳皮○血風腰疼芸薹
子搗碎○女人血結不通手發癱急不知其數薺菜一撮
順流水椰汁○手足痺痺柳根浸酒○女人血氣成塊築
心銀手燈心○血崩赤白帶其龍骨末好紅酒調○血風

中心狂言亂語渾身壯熱挑柳枝七寸○血刺成塊不散
菴蘭○文人癖氣膈氣炒茴香酒○婦人不問虛熱傷風
血氣潮熱增寒一切百病先以三服隨證湯引投之服以
他藥調理無不應驗○冷嗽猪血○心燥猪肝酒○催生
順流水滑石禹餘糧榆白皮苧子乳香葵子酸車草汁煎
湯或黃麻葉垂下者○胎衣不下再加茂朮地黃竹青○
行血菴蘭生地黃紅花蘇木陳艾臧揚芍藥加赤芍藥稍
王仙散 治婦人諸疾

香附子九錢炒黑 白芍藥各一 甘草一錢

右為細末每服三錢沸湯下○血崩不止竹葉煎湯下○
月水不行手足熱加生薑炒當歸煎不通湯下○月水不
勻當歸酒下○頻頻下血不住米飲下○氣痛及老婦人
忽下血加炒薑黃炒陳皮湯任下

補氣亦陽和中湯

治六脈俱中得弦洪緩相合按之無力弦

在上是風熱濕下陷入陰中陽道不行其證閉目則澤身
麻木晝少而夜甚覺而閉目則麻木漸退則絕無常開其
目此證不得懼其麻木不敢合眼致不得體皆重時有痰
嗽覺中常有痰而不利時有燥作氣短促而喘肌膚充盛
飲食不減大小便如常惟畏其麻木不敢合眼是其苦楚
觀其色脈形病相應而不逆內經曰陽盛瞋目而動輕陰
病閉目而靜重又云諸脈皆屬於目靈樞經云開目則陽
道行陽氣布通通身開目則陽道閉而不行如晝夜之分
知其陽衰而陰旺也且麻木為風三尺之童皆以為然細
按之有區別耳久坐而起亦有麻木為如繩繫縛之人釋
之覺麻木而不敢動久則自己以此驗之非有風邪乃氣
不行也治之當補肺中之氣麻自去矣知經脈中陰火乘

其陽分火動於中為水也當去陰火則愈矣時疫嗽
者秋涼在外在上而作也則實其皮毛以溫劑引重厚緩
前濕氣伏匿而作也時見燥作當升陽取氣益血微瀉陰
火與濕通行經脈調其陰陽則已矣非五臟六腑之本有
邪也補氣升陽和中湯主之

黃芪五錢

白芍藥

人參錢三

當歸身

白朮

橘紅

澤瀉錢二

草薢薏仁

黃蘗酒製

升麻

白茯苓

生甘草稍錢一

蒼朮一錢

佛耳草四錢

羌活草四兩

右以咀每服五錢煎法如常已時間服之

滋陰萬病丸

治虛勞血弱肌肉枯燥手足多煩疲節酸疼鬢

髮脫落面少顏色腹中拘急痛引腰脊去血過多崩傷內

竭胃中氣短晝夜不得眠情思不樂怔忡多汗

熟地黃

當歸各一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸不拘時米

飲送下

渾身碎痛飲子 治婦人勞倦

羌骨五錢

防風

藥本

甘草

白芷

茯苓各二錢

當歸

芍藥

續斷

白朮

附子各三錢

右為養末生薑棗煎服不拘時

黃芪飲子 治婦人血氣不足夜間虛乏有汗倦怠少力

黃芪

當歸

茯苓

五味子各半兩

芍藥

遠志

人參

白朮

浮麥各一兩

甘草三錢

右剉碎每服三錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓不

拘時服

理中扶苓湯

曾治一婦人六十歲病振寒戰慄太陽寒也呵欠

嚏噴足少陽口亡津液足陽明心下急痛而痞手少陰也

血脈為痞身熱近火亦有振寒戰慄也骨節下惡寒有寒

渾身黃而白睛黃寒濕也溺黃赤而黑頻數寒也

自病來身重如山便著床陰濕也其脈診得左右關并

又命門中得弦而急細雜之以洪而極緩之為寒加

方與水細以緩甚者濕也左尺按之至骨幸指來實

者壯也六脈被之俱空虛下焦無先以輕劑去其中焦

寒濕燕退其洪大脈理中湯

人參

白朮

乾薑

茯苓

去寒

甘草

炙各

右為細末每服二錢水一盞半煎至一盞水令寒服之謂

之熱因寒用其寒已對足太陽之假熱也以乾薑之辛熱以瀉真寒也故曰真對真假對假若不愈當以木附湯水之令寒以補下焦元氣也

黃芪白朮湯 治婦人四肢沉重自汗上至頭際頸而還惡風頭燥熱

黃芪 一兩

白朮

人參 各半

五味子 三錢

細辛 三分

蛇胡

升麻 各一錢

當歸身 半錢

吳茱萸

川芎 各半錢

黃蘗 酒製

羌活

甘草 炙各二錢

右咬咀每服半兩水二大盞生薑五片煎至一盞去滓稍熱食前服腹中不快加炙甘草一錢汗不止加黃蘗一錢地榆散 治婦人崩中漏下不止

地榆

劉

白芍藥

白茯苓

栢葉

微炒

鮮人

後炒

熟地黃

鹿角膠

黃碎炒

漏蘆

各一

芎藭

當歸

各三分

伏龍肝

半兩

乾薑

炮

桂心

甘草

各半兩

右剉碎每服三錢水一中盞入竹茹一分煎至七分去滓

食前溫服

栢葉散 治婦人崩中漏下不問年月遠近漸至黃瘦四肢無

力腹內疼痛不思飲食

栢葉

續斷

川芎

生地黄

當歸

龜甲

鼈甲

各一兩半

禹餘糧

二兩

阿膠

牡蠣

地榆

赤石脂

艾葉

鹿茸

各一兩

右為細末每服二錢食前粥飲調下一方有丹參加鹿茸

蜜和先如梧桐子大每服三四十丸空心用溫酒送下

或醋湯亦可

斷下湯 治衝任氣虛崩中漏下經脈不調每過月候將來臍
腹腰脚先痛漸減飲食四肢乏力及帶下三十六疾悉能
療之

人參去蘆

熟地黄

洗焙

艾葉

醋炒各一兩

烏賊魚骨洗灰

當歸

洗各二兩

川芎七錢

乾薑

炮半兩

阿膠

絲炒成

右呖咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓食前溫服

補宮丸 治婦人諸虛不足久不妊娠骨蒸形羸崩中帶下

白薇

牡蠣

煨

白茯苓

鹿角霜

山藥

白朮

白芍藥

烏賊魚骨

白芷

各等分

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心用米

飲送下

鹿茸散 治婦人崩中漏下不止遺精鹿膠

鹿茸二兩去毛洗

白龍骨

鱉甲塗酥炙令

熟地黃

白芍藥

白石脂

烏賊魚骨炙黃

續斷各兩

肉苁蓉

剉去兩半酒浸一宿去鹽皮炙乾

右為細末每服二錢食前粥飲調下

治崩漏方

四物湯 一兩人參二錢 吳茱萸一錢

右剉碎每服半兩薑棗煎服食前五六服寒熱腹痛皆退

崩漏未止續服後熟附丸

熟附丸

熟附子

木賊去節

龍骨炙

赤石脂煨各半兩

川芎

當歸各兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五六十丸食前用

米飲送下○一婦人年五十已上經斷七年忽然經行遂成崩漏發熱腹痛兩月不瘥予診其脈虛細疾數予曰此乃陰虛而致宜服此藥

小薊湯 治陽傷於陰令人下血前所謂天暑地熱經水滌溢當以此藥治之

小薊葉

洗切研取汁一盞

生地黄

一斤切白朮一兩

右入水一盞煎至一半去滓溫服或用小薊莖葉

加減四物湯 治室女二七天癸至亦有常時未至而後至者有卒然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過多變生諸證悉宜服之

川芎

熟地黄

洗焙

川當歸

去蘖酒洗切焙

白芍藥

各一香附子

每去毛一兩半

右以咀每服四錢以酒一盞半煎至五片煎至七分去滓食

前溫服如血色鮮而不止者六熟地黃和生地黃煎服

涼血地黃湯 治婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮守包絡相

火故血走而崩也

生地黃

當歸尾

各半錢

黃連

黃蘗

知母

藥本

川芎

升麻

各二分

紅花 多許

訶明

防風

川羌活

黃芩

細辛

荊芥穗

蔓荊子

甘草

一分

右咬咀作一服水三盞煎至一盞去滓空心稍熱服

治室女血崩不以冷熱皆可服

荊芥

蓮房殼

各等分各燒作灰

右為細末每服二錢空心米飲調下

十灰丸

治崩中下血不止

錦灰

黃綃灰

馬尾灰

艾葉灰

藕節灰

連房灰

油髮灰

赤松皮灰

棕櫚灰

蒲黃灰

右等分研勻用醋煮糯米糊和丸如梧桐子大每服七十丸加至一百丸空心米飲送下

十灰散 治下血不止

錦片

木賊

棕櫚

栢葉

艾葉

乾漆

鯽鱗

鯽鱗

血餘

當歸

生上各等分研末

藟香

少許研

右研勻每服二錢空心溫酒調服

鹿茸丸 治經候過多其色紫黑甚者崩下吸吸少氣臍腹冷

極則汗出如雨天脈微小由衝任虛衰為風冷客乘胞中

氣不能固可灸關元百壯不愈下工印三寸

鹿茸

鹿茸去毛

赤石脂

烏梅

艾葉

一方無

柏葉

附子

熟地黃

當歸

續斷

各二兩

右為細末酒糊和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫

酒送下一方煉蜜丸亦可

五靈脂散

治婦人血崩及治男子脾積氣

五靈脂

不以多少少少

右研末每服一錢溫酒調下此藥兼能解毒及蛇蝎蜈蚣

咬傷處立愈一方每服三錢水酒童便各半盞煎至八

分通口服名抽刀散治產後有瘀服三服散瘀血或心腹

脇肋脚痛不可忍或止用童子小便尤佳或中風即入

草烏頭半錢同煎亦治腸風下血如不飲酒者煎烏梅柏

葉湯調下如心煩口乾渴者加蒲黃炒減半一方燒存性

奇効四物湯 治有熱久患血崩

熟地黄 洗焙

阿膠蛤粉炒黃芩去黑者

右劉碎每服四錢水一盞半生薑五片煎七分空心溫服

有一醫家血崩桂枝四藥鋪市藥其方則四物湯加阿膠
大艾也此鋪分作八服又為鋪素黃芩半兩加在藥內鋪

家亦醫者曰此藥何為如黃芩醫曰非欲所知吾與此藥以黃芩為主文心主血血得熱則行得寒則止病者

服而愈服即入服至今無恙又見較羸血崩者亦用此醫
以黃連解毒湯加大艾油無不効者又當量其虛實用之

鶴頂丸 治帶下之證有三未嫁之女月經初下止而即得或

浴之以冷水或熱而刺或管厠此室之五帶下之田有家

之婦陰陽過多即傷肌絲風邪逆而八胞經觸冷涼使
穢液與血水相連而下之產後帶下因亡血失氣傷動胞
絡門開而外風襲肌體虛而冷風入冷風與熱氣相連攻
成液而下冷則多白而熱則多赤冷熱相交赤白俱下

當歸

配酒浸

附子

半兩

龍骨

半兩

吳茱萸

湯洗

去涎

赤石脂

醋炙

薑

各一兩

艾葉

一兩

以醋半

為末

牡蠣

蓋一兩

三錢

右為細末研勻餅糊和丸如梧桐子大以赤石脂末為衣

每服五十九空心用艾葉蓋湯為梅煎湯送下

治婦人經年血崩

香附子

二兩

蓮殼

五箇

燒

右為細末每服二錢空心陳米飲調下

烏金散

治血崩不止

棕毛

一兩

龍骨二錢

過

右為細末研勻每服三錢空心好酒調下二服立止

獨聖散 治婦人血崩不止

防風

去以多少

右為細末每服二錢食前酒煮白麴清調下日二服更以

麴作爲丸酒投之極驗

治婦人血崩不止赤白帶下或五色崩漏常服滋血調氣

香附子

去以多少

右為細末每服二錢食前熱酒調下放溫服米飲亦得

治崩中下血方 崩中藥多是用止血藥及補血藥惟此方

陽乘陰所謂天暑也熱經水沸溢者

黃芩

去以多少

右為細末每服一錢酒調下日一服月一服亦煎湯下近朝

有王御醫值夜忽有一室女子山崩其時暑月藥笥中
只有大順散兩貼以冷水調服旋即奏効以此知醫者要
在權變也

治婦人血崩方

右用烏梅燒灰研末以烏梅湯調下酒調亦可

縮砂散 治血崩

縮砂用新者去皮不以多
少於新瓦上炒香

右為細末每服三錢食前溫酒調下米飲亦可

梅飲子 治婦人血崩

右以鹽白梅七箇燒灰為末空心米飲調下

一笑散 治婦人血崩

右用新綿一口燒灰研末空心酒調下立止

治婦人血崩方

烏梅

一記大者半斤次者四兩

百草霜

研細

右搗和丸如梧桐子大每服三四十丸空心以淡醋湯送

下日進二服

膠艾湯

治勞傷血氣月水過多淋瀝漏下連日不止脐腹疼

痛及難艱將攝失宜胎動不安腹痛下墜或勞傷胞絡胞

阻漏血腰痛悶亂或因損動胎上搶心奔衝短氣及因產

乳衝任氣虛不能約制延引日月漸成羸瘦

熟地黄

白芍藥

各四兩

艾葉

微炒各三兩

阿膠

搗碎炒

芎藭

甘草

炙各二兩

右剉碎每服三錢水一盞酒六分煎至八分去滓食前熱

服日三病甚者連夜併服一方有黃芪

鎮宮丸

治婦人崩漏不止或下五色或赤白不定或如豆汁

或狀若豚肝或下如血片或崩漏不止或下如血片或崩漏不止或下如血片

入黃瘦口乾胃煩不食

代赭石酸 研 碎 紫石英酸 研 碎 禹餘糧火 研 碎 香附子醋 浸 二 兩

陽起石酸 研 碎 鹿茸酒 蒸 去 毛 扶神木 去 皮 阿膠酒 洗 碎 絲

當歸酒 洗 蒲黃炒 芎藭各 一 兩 血竭別 研

右為細末用艾煎醋汁煮糯米糊和丸如梧桐子大每服

七十九空心米飲送下

治漏下五色亦治嘔血令人黃瘦羸弱

右用地榆三兩坐碎以醋一斗煮十餘沸去滓食前稍熱

服一合○本草注云地榆主帶下十二病一曰多赤二曰

多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門僻

七曰合陰陽虛痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮

冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定一方作葉水煎服

代茶甚解熱

治白崩方

棕櫚燒灰

絲瓜條云魚鱗夏月入家或作涼柳者是也

右等分為細末空心酒調下

豆蔻散 治婦人白崩

右用白扁豆花焙乾為末炒米煮飲入燒鹽空心服數次即效紫者勿用

馬蹄元 治白漏不絕

白馬蹄

禹餘糧

各四兩

龍骨

三兩 烏賊骨

白礬蠶

赤石脂

各二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九空心酒送下不止加三十丸

牡蠣散

治帶下兼經水過多或暴下片血不限年月遠近

牡蠣

龍骨

赤石脂

肉蓯蓉

石斛去根 烏賊骨去甲 煅代別 半角 鹿灰

阿膠炒 熟地黃煨 芍藥二兩 乾薑炮

當歸切焙 人參 白朮 桑耳一兩

桂皮去粗 芎藭 附子炮去 艾葉炒

右為細末每服三錢平旦米飲調服日再

救急散 治婦人血傷無帶下積久不止面黃體瘦漸成羸

腰脚沉重胎氣多損

白茯苓去黑皮 木香 熟地黃焙 訶梨勒皮

栝子仁研 杜仲去粗皮炙 青橘皮去白 烏賊魚骨去甲

五加皮剉 艾葉燒灰 菖蒲 牛角腮灰

秦艽去苗土 赤石脂 兔絲子酒浸 當歸切焙

右為細末每服二錢溫酒調下糯米飲亦得或有胎息用

鯉魚糯米粥下藥

益胃升陽湯 血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸井藥為之先務舉世皆以為補氣殊不知井能生血比陽生陰長之理故先理胃氣入之身內穀為寶

黃芪 二錢

白朮 三錢

炒麴 半錢

人參 一錢半有

升麻

訶胡 半

陳皮

當歸 酒浸

甘草 炙各

生黃芩

湯盛暑之病與金所煩每服中加少許秋涼去之

右以咀每服一錢或二錢視食加減之如食少已定二錢

內更減之不可令勝食每服水二大盞煎至一盞去滓稍

熱服如腹中痛每服加芍藥三分去皮中桂少許如渴或

口乾加乾葛一分不拘時服

沉香牡丹花 治婦人血海久虛經候不利赤白帶下血氣衝

心多發刺痛四肢煩困

沉香

三分

牡丹皮

去心

赤芍藥

吳茱萸

湯洗

當歸

桂心

川芎

黃芪

去蘖

人參

茯苓

山藥

川巴戟

去心

白芷

橘紅

木香

乾生薑

白龍骨

牛膝

酒洗

枳殼

去穢

肉豆蔻

厚朴

製兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒

下若心腹痛白芷煎酒下

卷栢丸

治婦人室女腹臟冷熱相攻心腹絞痛腰腿寒赤白

帶下面色痿黃四肢羸乏

卷栢

醋炙

鹿茸

醋炙

白石脂

赤石脂

火煨

芎藭

艾葉

醋炒

桑寄生

代赭石

火煨

龜甲

醋炙

當歸

去蘖

地榆

各一

木香

不見

龍骨

乾薑

黃芪

熟地黃

右為細末醋煮糯米糊和丸如梧桐子大每服七十九空

心米飲送下

艾煎丸 治婦人一切虛寒胎前產後赤白帶下或成血瘕久

服此藥自然融化的

伏道艾

葉去塵土燥淨枝梗取葉研五兩先用大虎

使爛如泥

作餅子猛火焙乾

大漢

祇取日發便年合口者

二兩

醋三升同煎為末

當歸

酒浸

白芍藥

川芎

白薇

附子

大者

卷柏

取青

澤蘭

去枝梗取葉已

熟地黃

實者

淨洗

去浮青曬乾酒浸熟地黃入酒浸

右同為細末與前艾末飯末拌勻米醋煮糊和丸如梧桐

子大每服五七十九至百九二百九空心艾醋湯送下一

婦人因產後虛寒嘔惡不食腹痛如割時作寒戰復出盜汗變痺骨立臍腹之左結成硬塊其大如掌冰冷難盛昔此處獨無汗每塊微動則痛不可忍百藥治不効夢中忽有人授以此方因服之惡心寒熱盜汗輒止盡一料遂平後獨血塊如故服至五六料其塊白融化而出如魚凍

芎藭湯 一名芎藭溫中湯

治帶下漏血不止及風虛冷熱勞損

衝任月水不調崩中暴下腰重裏急淋瀝不斷及產後失血過多虛羸腹痛或妊娠胎動不安下血連日小便頻數肢體煩倦頭暈目暗不欲飲食

芎藭

黃芪

芍藥

乾地黄

吳茱萸

甘草

當歸

乾薑

右咬咀以水一斗煮取三升分三服若月經後因有赤白不止者除地黄吳茱萸加杜仲人參各二兩

麒麟竭湯 治婦人血傷赤白帶下小腹疼痛

麒麟竭 黃蘗去粗皮炙 地榆各一兩 禹餘糧醋炙

赤芍藥炒各二兩半 熟地黄切炒四兩一

右剉碎每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時服一方為細末食前粥飲調下二錢

茅花散 治血崩不止赤白帶下

茅花炒一握 棕樹皮三寸 嫩荷葉三張 甘草節二寸

右為細末空心酒調半匙服

治婦人赤白帶下不問遠年近日皆治

龍骨半兩 舶上硫黃三錢

右為細末每服半錢空心無灰舊酒調下

益母草散 治赤白惡露不止

益母草不以多少開花時取乾

右為細末每服二錢空心溫酒調下日三服

治帶下方

右用雲母粉溫水調下三錢匕立見神功

玳瑁丸 治赤白帶下不止

玳瑁

續斷各一兩

安息香

麒麟竭

乳香

沒藥

各半兩

故錦灰

三分

右為細末以蜜及安息香熬煉和藥末丸如菰豆大每服二十九食前溫酒送下

酒煮當歸丸

治癰疽白帶下疰脚氣腰已下如在水雪中以

火焙乾重重厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒之極也面白如枯魚之象肌肉如刀刮削瘦峻之速也小便不正與白帶常流而不禁固自不知覺面白目青藍如菜色目眦眦無所見身重如山行步欹側不能安地腿膝枯細大便難

秘口不能言無力之極食不下心下痞煩心懊懷不任其苦面停結背惡寒小便遺而不知此上中下三陽空氣竭故噦嘔不止胃虛之極也其脉沉厥緊而渴按之空虛若脉洪大而滿按之無力猶為身寒之證况按之不鼓是為陰寒之極也若空虛則氣血俱虛之極也

當歸

一兩

茴香

半兩

良薑

七錢

黑附子

炮去灰

右劉如麻豆大以上等醇酒一升半同煎至酒盡為度水炭火上焙乾同為細末

妙黃蘗

丁香

各半

金縷

三錢

訖胡

二錢

升麻

木香

各一

苦練

生用

玄胡索

甘草

炙各

右與前四味同為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心宿食消盡飯醋湯下忌酒膩熱物

補經固真湯 白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不効診得心

胞尺脈極微其白帶流而不止叔和八葉脈微云崩中日
久為白帶漏下多時骨木枯言崩中者始病血崩不已久
下則血少發亡其陽故白滑之物下流不止是本經血海
時枯津液獲亡枯乾不能滋養筋骨以本經行經藥為引
用為使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋滋津液以大
辛熱之氣味補其陽道生其血脈以苦寒之藥泄其肺而
收其上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥佐而益元氣
名曰補經固真湯

人參 二錢

橘皮

不去白

乾薑

末三

白葵花

十六箇

柴胡

甘草

炙

郁李仁

去皮

生黃芩

各一錢

右除黃芩外以水三大盞煎至一盞七分再入黃芩同煎
至一盞去滓空心帶熱服候少時以早膳壓之

丁香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所

得經隔少時其脉二尺俱弦緊時缺投之無力其證自覺

脐下如水水厚衣覆以禦其寒白帶白滑之物多間有屋

漏水下時有鮮血右尺脉時洪微也至漏米暴多下者是

急弦脉寒多如洪脉時見乃熱少合而明之急弦者北方

寒水多也洪脉時出者是命門包絡之火少也黑物多赤

物少合成至漏米之狀也

丁香四分 川芎 白芍藥 熟地黄四分

當歸身一分 生艾葉一分 阿膠六分

右作一服水二大盞煎至一盞半下膠烊再上火煎至

大盞帶熱空心候宿食消盡服之三兩服愈

治婦人赤白帶下不問年月深遠日漸羸瘦起止不得

刺薊根不以多少乾乾并每一斤以童子

右為細末每服二錢食前煖酒調下

茱萸浴湯 治下焦虛冷脬腹疼痛帶下五色月水崩漏赤白淫

不斷

吳茱萸 湯泡杜仲炒去絲 蛇床子 五味子

丁香各一兩 木香 丁香各一兩

右剉如麻豆大每用半兩以生絹袋盛水三大碗煎數沸
乘熱熏下部通手淋浴早晚二次熏洗

固真丸 治白帶久下不止脬腹冷痛陰中亦然目中溜火壅
其上視物眈眈然無所見牙齒惡熱飲痛須得黃連細末
擦之乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內故
喜乾而惡濕肝經陰火上熾走於標故上壅而目中溜火
腎水侵肝而上溢致目眈眈而無所見齒惡熱飲者是少
陽陽明經伏火也

當歸身

酒製

訖胡一錢

白石脂

水一錢

研少

火燒令赤

乾

白芍藥

黃蘗

酒製各半錢

乾薑

炮四錢

白龍骨

二錢

研水

前證乃寒濕為之也治法當大瀉寒濕以九子藥治之故
曰寒在下焦治主病宜緩以製大忌湯散以白石脂白龍
骨以枯其濕以炮乾薑大辛熱瀉寒水以黃蘗之大寒為
因用又為鄉導故云古者雖有重罪不絕人之後亦為之
伏其所主先其所因之意又瀉齒中惡熱飲也以訖胡為
本經之使以芍藥半錢導之恐辛熱之藥太甚損其所經
故微瀉之當歸身辛溫大和其血脈此用藥之法完備矣
右為極細末研勻水煮稀麪糊和丸如雞頭大日乾空心
候宿食消盡煎百沸湯令大溫多用送下無令胃中停滯
待少時以早膳壓之是不令熱藥犯胃也忌食生冷硬物
酒及濕麪

二豆散 治耳鳴心燥腰脚疼重腹內震鳴臍下至冷頻下白水如泔泄瀉諸

白苴菹

肉苴菹

丁香

巴戟

丁皮

蒼朮

黑附子 火煨

桂心 各一兩

人參

白朮

山藥

桔梗

茴香

粉草 各半兩

右剉碎每服三錢水一盞半生薑三片紫蘇葉三片同煎至七分去滓空心溫服

薑黃散

治血臟久冷腹脹疼痛小便澀白如泔

片薑黃

二兩

大附子

炮一兩

柳桂

木芍藥

紅藍子

三稜

各半兩

木香

牡丹皮

芫花 醋浸

郁李仁

去皮

沒藥 各一分

右為細末每服一錢酒煎服如腹痛用當歸沒藥為末以

水七分酒三分同煎七分熱服

內金鹿茸丸 治婦人勞傷血脈胞絡受寒小便白濁日夜無

變臍腹疼痛腰膝無力

鷄內金

鹿茸

黃芪

肉蓯蓉

五味子

遠志

牡蠣

桑螵蛸

龍骨

附子

各等分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食前用溫酒或米飲送下

治婦人久積虛寒小便白濁滑數不禁

右用鹿茸胥炒黃為細末每服二錢空心溫酒調下

又方 用鷄腫胫炙為末空心酒調二錢服

抑氣散 治婦人氣盛於血所以無子尋常頭眩暈滿體寒

怔忡皆可服

青附子

四兩

陳皮

二兩

茯神

甘草

炙各一兩

右為細末每服二三錢不拘時白湯調下

土牛膝散 治婦人室女血閉不通五心煩熱

土牛膝

當歸尾

各一兩

桃仁

炒去皮

紅花

各半

右為細末每服二錢空心用溫酒調下

溫經湯 治血海虛寒月水不利

當歸

川芎

芍藥

牡丹皮

蓬朮

桂枝

各半

人參

牛膝

各三錢

甘草 一錢

右分作二貼每貼水二鐘煎至七分不拘時溫服

通經丸 治婦人室女月水不通肚腹疼痛或成血瘕

桂心

青皮

大黃

川椒

去目

乾薑

炮

蓬朮

煨

川烏

炮

乾漆

炒去烟

當歸製

桃仁炒

右等分為末用上藥十分為率四分同米醋熬成膏和末
六分搜成劑臼中杵一二百下丸如梧桐子大每服二三
十九空心醋湯下一方不用川烏用紅花

三稜丸 治婦人經脈不通氣痛帶下煎治血癰

三稜 醋炒

川芎

牛膝

玄胡宗

蓬朮 醋炒

蒲黃

菴蓎

牡丹皮

芫花 醋炒

白芷

當歸

地龍 去土泥

乾薑 炮各

大黃

二兩為末以米
醋熬成膏和藥

右為細末以大黃膏和丸如梧桐子大每服三五十九空
心醋湯送下或紅花煎酒下

當歸散 治婦人天癸已過期經脈不勻或三四月不行或一

月再至以致腰腹疼痛蓋婦人七七數足而經脈不依時

者血有餘也不可止之宜服此藥

當歸

川芎

芍藥

山茱萸

去六

黃芩各一兩

白朮半兩

右為細末每服二三錢不拘時溫酒調服日三

芩心丸

治婦人七七已後天癸當住每月却行過多或不止

黃芩心

有枝條者二兩以米醋浸七
日炙乾又浸又炙如此七次

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服七十丸空心溫

酒送下日二服

橘歸丸

治婦人肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝血失常

經故也

橘皮

二兩

當歸

一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒送下

三神丸 治室女血氣腹中刺痛痛引心端經行澁少或月水不調以致疼痛

補皮

二兩

當歸

酒浸

玄胡索

醋炙各一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒送下

沒藥散

治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不下兒疳塊痛

沒藥

另研

血竭

桂心

玄胡索

當歸

蒲黃

紅花

乾漆

炒烟

木香

芍藥

各等分

右為細末每服二錢食前溫酒調下

靈寶散

治婦人血氣攻刺痛引兩脇

丁香

木香

乳香

玄胡索

當歸

白芍藥

各等分

右為細末每服二錢食前溫酒調下

加味烏沉湯 治婦人經水欲來臍腹方痛

烏藥

縮砂

木香

玄胡索

各一兩

香附

炒去毛

甘草

半兩

右細剉每服七錢水一盞半生薑三片煎至七分不拘時

溫服

琥珀丸 治婦人血瘀腹中有塊攻刺小腹腰背相引而痛久

而不治黃瘦羸乏

琥珀

研

川烏

炮去

牛膝

酒浸

白芍藥

鼈甲

醋炙

蓬木

炮

當歸

酒浸

澤蘭葉

厚朴

製

木香

不見

官桂

各半兩

麝香

半錢另研

右為細末酒煮麪糊和丸如梧子大每服七十九空心

用溫酒或米飲送下

當歸木香湯 治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩語聲沉重舌
根強硬言語蹇澁口苦不食白晝因睡夜有虛汗神思恍
惚夢寢驚悸面色痿黃頻發喘嗽遍身疼痛脚氣走注四
肢沉重背脾拘急時發寒熱五心煩燥唇乾多渴胃膈不
利咽喉噎塞尫羸瘦弱經日大脉為勞宜服

當歸 青皮 五加皮 海桐皮

陳皮 丁皮 桑白皮 地骨皮

牡丹皮 棕櫚皮燒存性研末已上各一兩 赤芍藥

木香各半兩

右為末每服一錢水一盞入香油一二點古錢一文洗同
煎至七分不拘時溫服

○胎前通治方

養胎飲 治妊娠惡阻嘔吐不食胎動不安或時下血

川芎

白朮

茯苓

去皮

熟地黃

酒蒸

熟地黃

地榆

當歸

去蘆

半夏

湯泡

白芍藥

阿膠

成

黃芪

去蘆

甘草

炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

半夏茯苓湯

治妊娠惡阻惡聞食氣胸膈痰逆嘔吐惡心

半夏

湯泡

赤茯苓

去皮

熟地黃

各

半旋覆花

陳皮

白

人參

去蘆

桔梗

白芍藥

川芎

甘草

炙各

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾空心服

竹茹湯

治妊娠嘔吐頭疼眩暈

人參

去蘆

白朮

橘紅

去白

麥門冬

去心

各

白茯苓

厚朴

薑製各

甘草

半錢

竹茹

彈子大

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

小地黃丸 治妊娘惡心嘔吐清水腹疼不食

人參去蘆 乾薑炮各等分

右為細末以生地黃汁和為丸如梧桐子大每服五十丸

食前米飲送下

參橘散 治妊娘三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

人參 橘皮去白 赤茯苓各三錢 麥門冬去心

白朮 厚朴薑製 甘草炙各錢

右作一服水二鍾生薑七片竹茹少許煎一鍾不拘時服

白朮散 治妊娘婦人宿有風冷胎發不長或失於將理動傷

胎氣多致損墮常服壯氣益血保護胎臍

白朮 川芎各一兩 牡蠣煅半斤 蜀椒去目炒

右為細末每服一錢空心溫酒調下

榆白皮散 治妊孕胎漏去血恐其難產常宜服之

渝白皮

葵根

瞿麥各二錢

火麻仁去殼

木通各一錢

牛膝苗一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

芎藭散 治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不能拊腹疼痛

右用川芎為末每服二錢不拘時溫酒調下

亡木散 治妊娘胎氣不和飲食少進

白朮炒

紫蘇各一錢

人參二錢

青皮去白

訶子

川芎各八分

甘草炙半錢

古作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

竹葉湯 治妊娘心驚膽怯終日煩悶者曰子煩

白茯苓三錢

防風

麥門冬去心

黃芩各二錢

右作一服水二鍾竹葉五片煎至一鍾不拘時服

知母散 治妊娘心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

知母

麥門冬去心

赤茯苓各一錢半黃芩

黃芪各二錢

甘草一錢

右作一服水二鐘入桑白皮半錢煎至一鐘再入竹瀝此

少同煎不拘時服

金生白木散 治難娠面目虛浮如水腫狀

白朮一兩

生薑皮

大腹皮

茯苓要

陳皮各半兩

右為細末每服二錢不拘時米飲湯調下

全生茯苓散 治難娠小便不通

赤茯苓

茯苓各半兩

右作一服水二鐘煎至一鐘不拘時服

瘦胎枳殼散 治難娠七八月常服滑胎易生

商州枳殼

五兩去白

粉草一兩

右為細末每服二錢空心白湯調下一方加香附尤佳

麥門冬湯 治妊娠心驚膽怯煩悶名曰子煩

麥門冬去心 白茯苓 防風各三錢 人參一錢

右作一服水二鍾生薑五片淡竹葉十葉煎至一鍾去滓不拘時服

桑寄生散 治胎漏經血妄行淋瀝不已

桑寄生 當歸去蘆 川芎 川續斷酒浸

何膠炒粉 香附子去毛 茯苓去木 白朮錢一

人參 甘草炙各錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

安胎散 治妊娠自高墜下或為重物壓觸胎動氣脹下血

縮砂不炒多少於砂中炒令熱去皮研

右為細末每服二錢不拘時熱酒調服艾鹽湯亦可如胃

產後吐者更宜服之

大腹皮散 治妊娠大小便赤澀

大腹皮

枳殼

去白

甘草

炙各一錢

赤茯苓

去皮三錢

右為細末每服二錢不拘時濃煎葱白湯調下

旋覆半夏湯

治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多卧少起

旋覆花

去莖

川芎

細辛

去土

人參

甘草

炙各七分

當歸

去蘆

半夏

湯泡

赤茯苓

去皮

乾生薑

陳皮

去白各一錢半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

安胎和氣飲

治胎冷腹脹痛引兩脇小便頻數大便壅滯

訶子

去核

白木

各二錢

陳皮

去白

高良薑

炒

木香

不見

白芍藥

陳木

炒

甘草

炙各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服忌食生

冷之物

大聖散

治妊娠怔忡胸裏多驚腹脇膨脹坐卧不寧

白茯苓

去皮

麥門冬

去心

黃芪

去蘆蜜炙

當歸

去蘆酒浸

川芎

各錢半

木香

不見火

人參

牡草

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

紫蘇飲

治胎氣不和揆上心腹脹滿疼痛謂之子懸

紫蘇葉

大腹皮

陳皮

去白

白芍藥

當歸

去蘆酒浸

川芎

各錢半

人參

去蘆

甘草

錢三

右作一服水二鍾生薑五片蔥白七寸煎一鍾不拘時服

芎藭補中湯

治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月而墮名

曰半產

芎藭

五味子

阿膠

炮炙

乾薑

炮炙

黃芪

去蘆蜜炙

當歸

去蘆酒浸

赤芍藥

白朮

各錢半

木香不見

人參

杜仲去皮

甘草各五

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

安榮散 治妊娠小便澀少遂成淋瀝

麥門冬去心 通草

滑石

人參

細辛各二

當歸去蘆酒浸

燈草

甘草各半

右為細末每服二錢不拘時麥門冬煎湯調服

桑縹蛸散 治妊娠小便不禁

桑縹蛸二十箇炙黃

右為細末每服二錢空心米飲調服

白薇散 治妊娠遺尿不禁

白薇 白芍藥各等分

右為細末每服二錢食前溫酒調服

當歸芍藥湯 治妊娠腹中疝痛下痢

當歸去蘆酒浸

白芍藥

白茯苓去皮 澤瀉

川芎

各一兩

白朮半兩

右為細末每服二錢空心用溫酒或米飲調下

芎蘇散

治妊娠外感風寒渾身壯熱脈暈頭旋心胃煩悶

川芎

紫蘇葉

白芍藥

麥門冬去心

白朮

陳皮去白

乾葛各一錢半

甘草五分

右作一服水二鍾生薑五片蔥白三寸煎一鍾不拘時服

百合散

治妊娠風壅咳嗽痰多喘滿

百合

蒸

紫苑茸洗

白芍藥

赤茯苓去皮

前胡

去蘆

桔梗去蘆

貝母去心

甘草五分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

驅邪散

治妊娠停食感冷發為瘧疾

白朮

草薢仁

高良薑炒

白茯苓去心

縮砂仁

藿香葉

橘紅

甘草炙五

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

平安散 治妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脇脹痛

川芎

木香錢各半

陳皮

熟地黃洗

乾薑炮

生薑

厚朴去皮炙

甘草錢各一

右作一服水二鍾入燒鹽一捻煎至一鍾不拘時服

消風散 治妊娠肝臟熱毒上攻太陽穴臂膊涎壅頭旋目暈

或腮項腫枕

石膏煨

防風去蘆

川羌活去蘆

甘菊花去灰

川芎

羚羊角銹

當歸去

大豆黃卷炒

荆芥穗

白芷錢一

甘草炙半

右作一服水二鍾好米半錢煎至一鍾食遠服

天門冬飲子 治妊娠肝經風熱上攻眼目帶下失明

天門冬 去心 知母 羌活子 五味子

防風 去蘆 茯苓 去皮 川羌活 去蘆 人參 各半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

枳實積柳丸 安養胎氣調和 便候破殼辟塊有似孕婦可以

久服血氣通和

枳實 生用 檳榔 黃連 黃蘗

黃芩 當歸 木香 阿膠 炙炒研各半兩

右為細末水和丸如小豆大每服三十丸不拘時用溫米

飲送下

黃芩湯 治婦人孕胎不安

黃芩 白朮 各半 當歸 二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

枳殼湯 治胎漏下血及因事下血

枳殼去穢

黃芩各二錢半

白朮四錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

玄効散 治胎痛不安如重物所墜冷如水

川芎

當歸各半兩

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

白朮散 治妊娘傷寒發熱頭痛胎動不安或時吐逆不下食

白朮

人參

橘紅

赤茯苓

川芎

前胡

麥門冬

各半兩夏

甘草各半兩

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

芍藥湯 治妊娘傷寒自利腹中痛食飲不下腫沉者太陰也

宜服此藥

芍藥

白朮各二錢

黃芪三錢

茯苓

甘草

錢各一

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

安胎當歸湯 治妊娘五月舉動驚愕胎動不安下在小腹痛

引腰痛小便疼下血

當歸

阿膠

川芎

人參 錢各二

棗十枚

父一握

右作一服酒一鍾水一鍾煎至一鍾不拘時服

旋覆花湯 治妊娘六七月胎不安嘔吐

旋覆花

半錢

厚朴

白朮

枳殼

黃芩

茯苓

錢各半

半夏

生薑

錢各一

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

人參橘皮湯 治惡阻病嘔吐痰水

人參 去蘆

橘皮

白朮

麥門冬 去心各二錢

白茯苓

厚朴 製各一錢

甘草 半錢

右作一服水二鍾生薑三片竹茹彈子大一塊煎至一鍾

食前服

人參丁香散

治妊娠惡阻胃寒吐逆反胃吐食及心腹刺痛

人參

四錢

丁香 一錢

藿香 二錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

二香散 治妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔吐酸水起

坐覺重

香附子 一兩

藿香葉

甘草 各三錢

右為細末每服二錢不拘時沸湯調下

枳梗湯 治妊娠肺壅咳嗽喘急

桔梗

紫蘇

人參

桑白皮

貝母

甘草 各七分

天門冬 去心 桑白皮 各一分

麻黃 一分

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

馬兜鈴散 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴

桔梗

人參

甘草

貝母 各一分

陳皮 去白

大腹子

桑白皮

紫蘇 各一分

五味子 七分

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

麻黃散 治妊娠咳嗽不止胎不安

麻黃

杏仁

桑白皮

甘草 各八分

紫苑

天門冬 各二分

竹茹 彈子

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓入蜜半匙再煎二沸不

拘特服

升麻散 治妊娠壅熱心神煩躁口乾渴逆

升麻 黃芩 人參 麥門冬

芫胡 枳子仁 犀角屑 瓜蒌根

茯神 各一錢 知母 甘草 各半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

芫胡散 治孕婦傷寒

芫胡 前胡 人參 生地黃

川芎 當歸 芍藥 粉草 各一錢二分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾不拘時

服要出汗加葱白一根煎

保安白朮散 治妊娠傷寒頭疼發熱此藥安胎

白朮 黃芩 新瓦上炒令香各半兩

右作一服水二鍾生薑五片紅棗三枚煎一鍾不拘時服

安胎阿膠散 治妊娠傷寒

阿膠炒 人參 桑寄生 白茯苓去皮

白朮等分

右為細末每服二錢不拘時糯米飲調下

安胎白朮散 治妊娠宿有冷胎痿不長或失於將理傷胎多

墮此藥補榮衛養胎氣

白朮 川芎各一兩 吳茱萸湯洗 甘草炙一兩

右為細末每服二錢食前溫酒調下忌生冷菓實之物

前胡湯 治妊娠傷寒頭疼壯熱肢節煩疼

前胡 石膏各半 黃芩二錢 梔子仁

知母 大青各二錢

右作一服水二鍾竹茹一塊葱白二寸煎一鍾不拘時服

黃龍湯 治妊娠傷寒壯熱頭疼黑吐不欲飲食脇下痛嘔逆

痰氣及產後傷風熱入胞絡寒熱如瘧并經水適來適斷
病後勞傷餘熱未除

芫胡

人參

黃芩

甘草

各二分

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

赤茯苓散

治妊婦小便不利及水腫酒上惡寒動轉前痛

赤茯苓

去皮

葵子

各半分

右為細末每服二錢不拘時新汲水調下

犀角散

治妊婦人諸風熱困倦時發昏眩

犀角

揀參

山梔仁

川羌活

黃連

青黛

川芎

吳白芷

茯苓

甘草

各一分

右作一服水二鍾生薑三片竹葉七片煎一鍾食遠服

大寧散

治妊婦下痢赤白及泄瀉疼痛

黑豆

七十

甘草

七十半

粟殼

七箇去頂蒂

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

火龍散

治妊娘心氣疼

川練子

茴香

各三

艾葉末

鹽炒一

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

獨聖散

治妊娘小便不通

右用蔓荊子為末每服二錢食前濃煎葱白湯調下

萬應丸

治妊娘胎動不安及產後小戶痛不可忍

右用知母去皮炒為末煉蜜和丸如彈子大每服一九以

清酒一盞化開食前服

秦光散

治妊娘時氣五六日不得汗口乾多契冷水狂言嘔

逆者宜服

秦光

訶胡

各半

石膏

二錢

赤茯苓

前胡

升麻

葛根

犀角屑

黃芩

甘草

各人分

右作一服水二鍾生薑五片竹茹一塊煎一鍾食前服

人參散 治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參

橘紅

厚朴

薑製各二錢

當歸

乾薑

甘草

炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗三枚煎一鍾不拘時服

厚朴散 治妊娠下痢黃水不絕

厚朴

薑製四錢

黃連

半三錢

肉苳蔻

煨二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

黃連湯 治妊娠下痢赤白不止

黃連

八錢

厚朴

製二錢

阿膠

炙

當歸

各六錢

黃蘗

艾葉

各四錢

乾薑

五錢

右為末每服二錢空心米飲調下

華蓋散 治妊娠遍身腫

華蓋

茯苓

桑白皮

郁李仁

各一錢半

白朮 四錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服小便利即愈

催生丹 治產婦生理不順臨產難產

乳香 另研一分

母丁香

另研一分 臘月兔腦髓 去皮炭研

麝香 另研一字

右碾勻用兔髓和丸如鷄頭大陰乾以油紙密封裹每服

一丸臨時溫酒送下

催生如聖散

右用黃蜀葵子不拘多少為細末每服二錢不拘時熱酒

調下熱湯亦可

香桂散 下死胎

麝香半錢 另研 官桂二錢 另研

右研勻作一服溫酒調服須臾即下

來甦散 治臨產用力太過氣血暈悶不省人事

木香不見火 神麴炒 陳皮去白 白芍藥

阿膠蛤粉炒 麥蘖炒 黃芪去蘆 生薑炒黑各一錢

糯米一撮 苧根洗淨一錢半 甘草炙二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾幹開灌連進為愈

無憂散 治胎肥氣逆臨蓐難產

當歸去蘆酒浸 川芎 木香不見火 白芍藥

枳殼去白炒 甘草炙各一錢半 乳香另研 血餘燒灰另研各半

右作一服水二鍾煎至八分入乳香血餘和勻不拘時服

澤瀉散 治妊娠氣壅身體腹脇浮腫喘急大便不通小便赤

滋宜服

澤瀉

木通

桑白皮

赤茯苓

枳殼

檳榔

各半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

防已湯

治姙娠脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已半錢

桑白皮

赤茯苓

紫蘇葉各二

木香五分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

四製艾附丸

治婦人數墮胎由氣不升降所以胎氣不固尤

宜服此

香附

并去毛淨一斤分作四分一分用酒浸一分醋浸一分薑水浸一分鹽水浸一分各浸七日取出焙乾

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服七十丸空心溫

酒送下肥人只依本方瘦人加澤蘭葉赤茯苓各二兩

一方用香附子一斤艾葉四兩當歸二兩俱用酒洗

琥珀丸 治婦人產前產後百病及療三十六種血冷七疝八

癥心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風十二痺手足痠疼

乳中毒結瘀血懷胎驚動傷犯不安死胎不出并胎衣不

下並宜服之

琥珀另研 辰砂另研 阿膠碎炒 五味子揀淨

石斛去根 附子炮去皮 肉桂去粗皮 沉香不見火

川芎各半 牛膝去苗酒浸 當歸去苗炒 肉蓯蓉酒浸

人參 續斷 沒藥各三分 熟地黃

木香不見火各一兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸空心煖酒化下

午後食前再服能生新血去惡血○若腹脇疼痛繞臍如

刀刺及嘔逆上氣染心痰毒不思飲食用薑汁少許和酒

化服○諸痢及赤白帶下血冷崩中下血崩漏下血用生
薑與艾剉炒令赤色入酒同煎數沸去滓調服○世瀉不
止陳米服○澀尿諸淋煎通草燈心湯服○血暈不知人
煎當歸酒調服○上熱下冷煎人參湯服○遍身虛腫水
氣煎赤小豆湯服○產內二毒傷寒及中風角弓反張如
板硬煎麻黃湯服以衣被蓋出汗○月經不通或間雜五
色煩併而下斷續不止飲食無味肌膚瘦劣面赤唇焦乍
寒乍熱四肢煩疼五心燥熱黑點遍身血斑赤腫走注及
血風勞傷無力用童子小便入薑汁少許調服常服以小
便為妙若恐惡心和以半酒○如懷胎婦於臨月一日一
服至產下不覺疼痛或服至五服十服日倍飲食是藥功
也其功不能具述

交感地黃煎丸

治婦人胎前產後服見黑花或即發狂如見

鬼狀胞衣不下失音不語心腹脹滿水谷不化口乾煩渴
寒熱往來口內生瘡咽中腫痛心虛忪悸夜不得眠及產
後中風角弓反張面赤牙關緊急崩中下血如豚肝狀臍
腹汚痛血多血少結為癥瘕恍惚昏迷四肢腫滿產前胎
不安產後血刺痛並皆治之

生地黃

洗淨研以布裂汁留滓以生薑汁炒地黃滓

生薑

洗淨研以布裂汁留滓以生薑汁炒地黃滓

當歸

洗淨研以布裂汁留滓以生薑汁炒地黃滓

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前用當歸煎

湯化下

德賢湯

治胎前產後身疼保室論云身疼者肌體不實而受

風邪客於經絡邪氣與正氣相搏交擊於骨肉之間致身
疼而不全用龍蠶湯主之若難張而患身體疼者必因勞

役過多致使然也不爾經絡受風寒愈痛尤防風湯主之
產者必因勞役身疼而不能動轉者良由產後百節開張
血脉流走氣弱則骨肉之間血多凝滯是故百節經脈緊
急腰背不法轉側手足不能動搖身熱若納炭頭如釘釘
醫者不識妄為傷寒發汗變生他證宜服

黃芪

一兩

當歸

去蘆

牛膝

洗去苗酒浸一宿去急用酒蒸熟為度

白朮

防風

去蘆

獨活

去蘆

甘草

各二錢半

右咬咀每服半兩水五盞生薑十片蘆白一握同煎至三
盞去滓不拘時服

佛手散

治產前產後腹痛體熱頭疼及絳產未進別物即先

服此藥逐敗血生新血能除諸疾

川芎

二兩

川當歸

三兩

右為細末每服二錢水一盞酒二分同煎七分溫服〇一

方為龍末每服四錢水七分酒三分同煎至七分熱服將
產前先安蘇此藥將兩服藥煎之產了速進之三日內日
二服三日外一服○一方名芎歸湯只此二味等分以酒
水煎專治失血傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血
拔牙去血不止一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事
頭重目暗舉頭欲倒悉能治之若產後眩暈宜加芍藥服
之○一名桂香散治產後腹痛不可忍者加桂心等分酒
與童子小便合煎服之立効○一名當歸湯治姙娠子死
或未死胎動不安每服用酒水合煎連進數服胎若已死
服之便下若未死其胎即安此經累効萬不失一○一名
琥珀散臨月服之只縮胎易產兼治產後諸疾○一名羊
肉湯治羸損羸乏腹中疝痛往來寒熱吸吸少氣不能支
持頭眩汗腹內拘急每服用精羊肉一兩生薑十片水

二盞煎至六分溫服○一名君臣散治婦人室女心腹疔
痛經脈不調用水煎服○若妊婦胎氣不安產後諸疾加
酒煎服○一名芎當散治婦人血氣上喘下腫二味等分
為細末每服二錢空心煎艾湯調下又治產後損身血衝
心及腹脹氣絕者神驗○難生倒橫子死腹中先用黑大
豆一大合炒熟水一盞入童子小便一盞藥末四錢同煎
至一盞以上分作二服未効再作○產後惡血注心迷悶
喘急腹痛依前用黑豆加生薑自然汁半合煎服○治臍
毒每服一錢半入炒槐花末半錢水一盞煎至六分無時
候服三日取下血塊即愈○如產後頭疼加荊芥煎如吐
血亦宜服之○若產難多用百草霜香白芷等分為末
為金散每服二錢童子小便好醋各一合沸湯浸服止一
服見効甚者再服已分免矣○一法以五積散加醋煎服

亦能催生○若崩中漏下失血過多久不能止用芎歸湯
療之不止者以香附子炒去皮毛為細末每一兩入甘
草末一錢清米飲點服名順元湯○有白帶者於順元湯
內加芍藥半兩或謂香附耗氣則不然許學士謂滋血養
氣婦人僊藥雖羸人亦宜服之○兼治男女血衄便利及
諸證失血用此藥佐以米飲九百章霜末每服百餘丸或
以其他燒灰藥皆能作効不可遽以燥澁之劑止之必致
壅遏腐敗却生他證大抵血不能行氣使之然者氣得其
平則血循故道必無妄行之患矣香附子善能導氣用之
勿得其宜

返魂丹 治婦人胎前產後諸疾危證

右用赤箭即野天麻葉似艾葉開紫花如紅蓼花形名荒
蕪子又名益母草又名大扎又名貞許又名負檐四五月

採取陰乾用葉及花子以磁器研為細末煉蜜和丸如彈
子丸隨後治證嚼服其根燒存性為末酒調服功与黑神
散不相上下○如胎前臍腹作癢或作声者溫米飲下○
胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不止水煎秦艽糯米
湯下或當歸湯亦可○如產時先用一丸以童子小便化
下安魂定魄氣血自然調順諸病不生又能破血止痛養
脉息調經絡溫酒下○產後胎衣不下血在胞中及橫生
不順死胎經日不下者脹滿腹中心悶心痛炒鹽湯下○
產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童子小便無灰
酒各半下○產後咳嗽胃膈不利惡心口吐酸水面目浮
腫兩脇痛卒動失力者溫酒下○產後兩太陽痛呵欠心
忪氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼
痛溫米飲湯下○產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如

見鬼神狂言不省人事薄苛自然汁如無生煮濃煎薄苛湯下及童子小便酒各半亦可○產後面垢顏赤五心煩熱或結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗者童子小便酒各半下溫薄荷自然汁亦可○產後餘血惡露不盡結滯臍腹刺痛惡物上衝心胃主悶者童子小便酒各半下○產後大小便不通煩燥口苦者薄荷自然汁下如無生者濃煎薄荷湯下○產後瀉血者水煎棗湯下○產後白帶下者煎膠艾湯下○月水不調溫酒下○血崩漏下溫酒下○婦人久無子息溫酒下服之十九至二十九亦能注喜○一子死腹中蓋因卒病臟腑熱極蒸其胎是以子死也蓋子死不居子宮或墮胎於腹間冷痛小便沫出腹脹四肢逆冷瓜甲青者是也或臨產之時此藥安魂定魄血氣自然調順諸疾不生破血補虛止痛養血氣調經絡

用童子小便各七分化下○二產難者胎以食母之血十月滿足則餘血結成塊俗呼為兒枕欲產之時血塊先破敗血裹其子是以難產或產後惡物不盡臍腹刺痛惡物上衝心胃主悶用童便酒各七分化下○三胎面黃赤胎衣不下既產了臟腑虛羸五心煩燥血流入衣中則難出發寒熱有冷汗出但去其敗血其衣自出如帶斷了服此藥下或橫生不順心悶欲死者童便酒各七分化下薄荷自然汁鹽湯亦可○四產後三日起卧不得眼前黑暗生花蓋產後血氣未定運走五臟入肝則目昏俗為暗風醫家以風治之或血熱口乾煩渴心悶亂如見鬼神狂言妄語不省人事童便酒各七分薄荷自然汁亦可○五產後口乾心悶及煩渴者血氣未定即食熱麪積滯在內以致熱燥煩渴者俗為胃滿壅塞或兩太陽穴痛可欠怔忡氣

短身體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛者溫米飲重便各七分化下○六產後四肢浮腫又寒熱者益因敗血流入五臟滲入四肢停留日久化為膿狀氣喘或小便澀或咳嗽胃脘不利惡心口吐酸水兩脇疼痛辛動乏力溫酒化下○七產後寒熱往來蓋因敗血入心則熱入脾則寒狀如瘧臍腹作痛或作聲溫米飲化下桂枝湯亦可○八產後中風牙關緊急半身不遂失音不語重便酒各七分化下○九產後痢未經月滿或誤食物下與血相攻擊前所積受濕以此敗血相攻煎裹湯下○十產後大便秘結口苦煩渴非時不語以敗血衝心而蔽其孔童便酒各七分化下薄荷汁亦可○十一產後遍身疼痛百節開張血乘虛流入腸中停留不散臍腹疼痛米飲化下○十二產後崩中漏下不止蓋是傷酸物狀如鷄肝

脊背倦悶煎糯米素苋湯化下常歸桂枝湯亦可○十三
產後未經月滿血氣不通蓋是月水未還或食熱麪壅結
成塊喘嗽四肢無力多睡而汗出不止月水不調為腎蒸
勞使服此藥童便酒各七分化下○十四產後吐逆不止
蓋因敗血停於脾胃即發吐逆胃膈膨脹俗為反胃溫酒
化下○十五產後鼻衄口乾舌黑蓋因心臟熱則舌黑鼻
衄也童便酒各七分化下○十六產後赤白帶下煎素苋
湯下○十七產後氣急喉中猶聲者蓋因敗血衝心入喉
中萬無一瘥矣○十八產後中風者蓋因未經七月勞動
則百日之中傷房事中風初病之狀眼澁腰強筋急角弓
反張牙關緊急若此者皆自傷犯耳○十九產後面色黑
又遍身生黑靨者乃敗血入皮膚萬無一瘥矣

旋覆湯

治產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅塞

旋覆花

麻黃

前胡

杏仁

去尖炒

五味子

荆芥

半夏麴

甘草

炙各一兩

赤芍藥

茯苓

各二兩

古作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

芎歸湯 治產後去血過多血暈不省

芎藭

當歸

各半兩

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服腹中刺痛加白芍藥

口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加白芍藥水停心下加

茯苓生薑震煩不得眠加人參竹葉

黑神散 治婦人產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心及腹痛

黑豆

炒半升

當歸

去芦酒浸

肉桂

去皮

熟地黃

乾薑

蒲黃

芍藥

甘草

炙各四兩

右為細末每服二錢不拘時用溫酒童子小便各半調服

四順經中丸 治新產血氣俱傷脾胃不調百日内宜常服

人參 去芦 乾薑 炮 白朮 各一兩 甘草 各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲送下

人參當歸散 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛則生內熱

其證心胃煩滿呼吸短氣頭痛悶亂肺時轉甚與大病

虛煩相類

人參 去蘆 當歸 去蘆 肉桂 去粗皮 熟地黄

麥門冬 去心各二錢 白芍藥 半錢 血熱甚者加生地黄二錢

右作一服水二升粳米一合淡竹葉十片煎一鐘食遠服

當歸養血丸 治產後惡血不盡發熱身痛經閉者宜服

當歸 去芦 赤芍藥 牡丹皮 玄胡索 炒各二兩

肉桂 一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫酒或

米飲任下

四順散 治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

川芎

當歸 去蘆

乾薑 炮

赤芍藥

各等分

右為細末每服二錢食遠用溫酒調服

當歸黃芪湯

治產後失血過多腰脚疼痛壯熱自汗

當歸

去蘆

黃芪

芍藥

各四錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

當歸散

治產後氣血俱虛慎勿大補恐增客熱別致他病常

令惡露快利

當歸

芍藥

川芎

黃芩

各一兩

白朮

半兩

右為細末每服二錢不拘時用童子小便或溫酒調服

七珍散

治產後不語論曰產後不語者何荅曰人心有七孔

三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了
又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此者
但服此藥

人參 去蘆

石菖蒲

生地黄

川芎

各一兩

細辛 二錢

防風

辰砂

另研各半兩

右為細末每服二錢不拘時薄荷煎湯調服

玉露散 治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏疼大便秘

川芎

桔梗

白芷

各二錢

芍藥

當歸

各半

人參

白茯苓

甘草

各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服如頭熱甚大便秘者

加大黃三錢

當歸血竭丸 治婦人產後惡露不下結聚成塊心胃痞悶又

臍下堅痛

當歸

血竭

芍藥

蓬朮

二炮各兩

五靈脂

四兩

右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服五十丸食前服溫

酒送下

川芎散

一名芎藭散

治產後頭疼不止

川芎

大者

為藥

云定各等分

右為細末每服三錢不拘時用秤銚燒紅淬酒調服

三之一湯

治產後血勞發熱日久不安

羌活

黃芩

人參

半夏

川芎

當歸

芍藥

熟地黃

甘草

各半一錢半

石作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

增損此胡湯

治產後經水通斷感於異證手足搐牽咬牙昏

胃繫屬上焦

訖胡二錢

黃芩

人參

石膏

知母

半夏

黃芪

甘草

第一錢半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾食遠服

人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗

人參去蘆

當歸去頭

右各等分為末以猪腰子一隻去膜切作片以水二鍾糯米半合葱白二根煎米熟取清汁一鍾半入藥末一錢煎至一鍾不拘時服

失笑散 治產後心腹絞痛飲絕

蒲黃炒

五靈脂

酒研均去砂石各等分

右為細末先用米醋調二錢熬成膏入白湯半盞化開服
清魂散 治產後血暈昏不知人事更宜取乾漆燒煙鼻中熏

之方中頻置醋炭火進此藥

澤蘭葉

人參

去蘆各川芎二兩

荊芥穗四兩

甘草

錢八

右為細末每服二錢不拘時白湯溫酒各半盞和勻調下
增損四物湯 治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露未盡停
滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

川芎

白芍藥

當歸

去蘆乾薑

人參

甘草

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

調經散 治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮腫不可作

水腫治之但調經其腫自消又有去血過多心虛易驚加

龍腦骨燬

當歸

酒浸

赤芍藥

各一

細辛一錢

麝香

另研半錢

琥珀另研

肉桂

火不見

沒藥另研

甘草

炙各二錢

右為細末每服二錢不拘時生薑汁溫酒任意調下

起痛散

治產後血滯經絡拘攣腰背強直遍身疼痛

當歸

官桂

火不見

獨活

川牛膝

去蘆酒浸

白朮

黃芪

生薑

蘆白

甘草

桑寄生

半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

抵聖湯

治產後血氣傷于脾胃腹脇滿悶嘔吐惡心

赤芍藥

半夏

陳皮

澤蘭葉

人參

生薑

甘草

炙半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

濟危上

治產後下血過多虛極生風唇青肉冷汗不止

王靈脂

卷柏

生用

乳香

太陰玄精石

桑寄生

硫黃另研

陳皮去白

阿膠蛤粉炒

右將前四味同研勻石器內微火炒勿令焦再研極細却入後四味藥末以生地黄汁和丸如梧相子大每服五十丸食遠當歸煎酒送下

熟地黄湯 治產後血暈不止少氣脚弱服眩飲食無味

熟地黄

酒洗切片

人參去蘆

麥門冬去心各二錢

瓜蒌根

三錢甘草炙

右作一服水二鍾糯米一撮生薑三片紅棗三枚同煎至一鍾不拘時服

地黄散 治產後惡物不盡腹中疼痛

生地黄

沙當歸

生薑

半兩切如豆大

右為細末每服二錢食前薑酒調下

卷荷散 治產後血上冲心血刺血暈血氣不通惡露不快

卷荷初出

紅花

當歸各一兩

蒲黃炒

牡丹皮各半兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下一服內童子小便調

四味湯 治產后一切諸疾總方分免一服尤妙

當歸心膈煩加半錢

玄胡索氣悶喘加半錢

血竭惡露不快加半錢

沒藥心腹振痛加半錢

右等分為細末每服二錢食前以童子小便一鍾煎至六

分溫服

獨行散 治產後血暈昏迷不省衝心悶絕

五靈脂二兩半生半炒

右為細末每服二錢溫酒調下口噤者拘開口灌之入喉

即愈一方加荆芥為末童便調服如血崩不止加當歸酒

童便煎不拘時服

胡氏蘇鳳散 治產后閉目不語

右以白朮研細熟水調二錢不拘時服

二母散 治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽

知母

貝母

人參

桃仁

杏仁

並生用去尖各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

參蘇飲 治婦人產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參

為末

蘇木

二兩健碎

右先以水二碗煮取蘇木汁一鍾去滓調人參末二錢不

拘時服

丁香散 治產後心煩咳嗽不止脾胃虛寒嘔吐發逆

丁香

白芷

各半

伏龍肝

一兩

右為細末每服二錢食遠桃仁吳茱萸煎湯調下

瑞蓮散 治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮 有性殺 棕桐 性殺 當歸 肉桂 各一

橫柳 二枚 鯉魚鱗 燒 川芎

右為細末每服二錢食前用煨生薑煎溫酒調下

漢防已散 治產後風塵氣壅上攻頭目浮腫

漢防已 猪苓 枳殼 桑白皮 各二錢

商陸 甘草 各一錢半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

三分散 治產後日久虛勞發熱

川芎 當歸 芍藥 熟地黄

白朮 白茯苓 黃芪 各一錢 芫胡

人參 各半錢 黃芩 半夏 甘草 各半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食前服

言窮散 治胎衣不下

芍藥

當歸

各半兩

榆白皮一兩

右為細末每服二錢食前用生地黄汁同溫酒調下

牡蠣散 治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四肢乏弱頭目昏

莖煩熱

牡蠣

川芎

白茯苓

熟地黄

龍骨

各一兩

續斷

當歸

五味子

艾葉

酒炒

人參

地榆

甘草

各半兩

右為細末每服二錢生薑三片紅棗一枚用水一鍾半同

煎七分食前服

桂心丸 治產后血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四

肢羸瘦煩疼

桂心

當歸

赤芍藥

牡丹皮

沒藥

檳榔

各半

青皮

乾漆

炒烟盡各

大黃

桃仁

去皮

三稜

玄胡索

醋炙

厚朴

製各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三四十丸食前用

溫酒送下

草菓飲乎 治婦人產後瘡疾寒熱相半或多熱者

草菓

炮去

半夏

湯泡

川芎

赤茯苓

陳皮

白芷

各一

良薑

青皮

去白

紫蘇

甘草

炙各

乾葛

二錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

生熟飲子 治產后瘡疾多寒者

內置龜

草菓仁

厚朴

生用

半夏

陳皮

甘草

大棗

去核

生薑

各等

右 和勻一半生用一半以濕皮紙裹煨

不用將藥和勻每服以麩水二盞煎至七分去滓

服食後一服

皂蛤散 治婦人吹妳腫痛頭疼發熱

皂角 燒一挺不結者 灰存性

蛤粉 用真者 各等分

右為細末每服二錢食後用熱酒調服取汗出為度

連翹湯 治產後妬乳并癰

連翹 升麻

芒硝

玄參

芍藥 白欬

防風

射干

大黃 杏仁

井草 各一

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服